

**Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.**

**1. В приемном отделении могут быть оказаны следующие виды медицинской помощи:**

- а) паллиативная
- б) доврачебная
- в) первая врачебная
- г) специализированная
- д) первична медико-санитарная

**2. Канал госпитализации плановых больных:**

- а) скорая медицинская помощь
- б) распоряжение главного врача
- в) «самотек»
- г) перевод из другой лечебно-профилактической организации

**3. Форма медицинской карты стационарного пациента:**

- а) 001/у
- б) 003/у
- в) 007/у
- г) 066/у

**4. Основные задачи приемного отделения:**

- а) обследование и лечение больных
- б) прием и выписка больных
- в) прием больных, осмотр, оформление первичной медицинской документации, распределение больных по отделениям
- г) передача телефонограмм в милицию обо всех несчастных случаях

**5. Санитарный пропускник состоит из 3-х последовательно расположенных помещений:**

- а) ванна, душевая
- б) клизменная
- в) комната для раздевания
- г) комната для одевания
- д) комната для хранения вещей
- е) смотровая

**6. Утвержденные формы документации приемного отделения МЗ РФ:**

- а) журнал учета наркотических средств
- б) статистическая карта выбывшего из стационара
- в) правила внутреннего распорядка больницы
- г) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- д) порционник

**7. Форма журнала приема больных и отказов в госпитализации:**

- а) 001/у
- б) 007/у
- в) 039/у
- г) 066/у

**8. При обращении больного самотеком медсестра приемного отделения обязана:**

- а) осмотреть больного и направить в отделение по профилю
- б) осмотреть больного, направить к дежурному врачу в отделение
- в) выслушать жалобы больного, пригласить дежурного врача
- г) оказать доврачебную помощь, отправить в поликлинику

**9. Прием пациентов в приемном отделении при плановой госпитализации включает:**

- а) оказание высокотехнологичной медицинской помощи
- б) оказание квалифицированной медицинской помощи
- в) оказание первой медицинской помощи
- г) регистрацию пациентов
- д) транспортировку в отделение

**10. Какие отделения больницы должны иметь самостоятельное приемное отделение:**

- а) кардиологическое
- б) детское
- в) реанимационное
- г) инфекционное
- д) родовспомогательное
- е) хирургическое

**11. Обязательными документами при приеме больного в стационар в плановом порядке являются:**

- а) паспорт
- б) направление из поликлиники
- в) страховой полис
- г) минимум обязательных анализов и результатов диагностических исследований
- д) карта амбулаторного больного
- е) справка из кожно-венерологического диспансера

**12. Столбняк – это заболевание:**

- а) острое вирусное
- б) острое инфекционное
- в) острое аллергическое
- г) хроническое инфекционное

**13. Форма журнала записи амбулаторных больных:**

- а) 001/у
- б) 003/у
- в) 066/у
- г) 074/у

**14. Использованный медицинский одноразовый инструментарий подлежит:**

- а) дезинфекции
- б) предварительной обработке
- в) стерилизации
- г) утилизации
- д) утилизации после дезинфекции

**15. При положительной пробе на кровь на инструментах появляется окраска:**

- а) зеленая
- б) розовая
- в) сине-фиолетовая
- г) бурая

**16. При выявлении инфекционного заболевания или подозрении на него по назначению врача:**

- а) провести санобработку пациента
- б) провести противоэпидемические мероприятия
- в) отказать пациенту в госпитализации
- г) принять пациента, сделав отметку на титульном листе стационарной карты

**17. Для оценки качества очистки инструментария от моющего средства используют пробу:**

- а) азопирамовую
- б) с бензойной кислотой
- в) фенолфталеиновую
- г) судан III

**18. При подготовке к экстренной операции необходимо в приемном отделении:**

- а) поставить очистительную клизму
- б) побрить операционное поле
- в) промыть желудок
- г) завести зонд в желудок
- д) провести санитарную обработку пациента

**19. При поступлении в приемное отделение тяжелобольного проводится:**

- а) полная санитарная обработка
- б) частичная санитарная обработка
- в) санитарная обработка не проводится

**20. Медицинские термометры после дезинфекции хранят в:**

- а) растворе дезинфектанта
- б) растворе антисептика
- в) сухом виде
- г) ультрафиолетовой камере

**21. После осмотра пациента кушетки обрабатывают раствором:**

- а) антисептика
- б) дезинфектанта
- в) мыльным
- г) 96% этилового спирта

**22. Обработка медицинских термометров проводится в растворе:**

- а) моющем
- б) антисептика
- в) дезинфектанта
- г) стериллянта

**23. Осложнения внутримышечных инъекций:**

- а) абсцесс
- б) воздушная эмболия
- в) инфильтрат
- г) полом иглы
- д) некроз

**24. Транспортировка тяжелобольного в отделение из приемного отделения проводится:**

- а) пешком, в сопровождении медсестры
- б) в кресле-каталке
- в) на каталке
- г) на лифте в сопровождении родственников
- д) вид транспортировки не играет роли
- е) на носилках

**25. Какова должна быть концентрация спирта при обработке инъекционного поля:**

- а) 96%
- б) 70%
- в) 45%
- г) 33%

**26. Цель медицинской сортировки в приемном отделении - выявление:**

- а) опасных больных для окружающих
- б) нуждающихся в эвакуации
- в) нуждающихся в неотложной медицинской помощи
- г) поражающего фактора
- д) поступивших по каналу «РГВ»

**27. Время появления трупного окоченения:**

- а) 4 – 6 часов
- б) 2 – 4 часа
- в) 1 час
- г) 30 минут

**28. В приемном отделении должны быть зарегистрированы пациенты:**

- а) все обратившиеся
- б) кому отказано в госпитализации
- в) госпитализированные
- г) переведенные в другие лечебно-профилактические организации

**29. Обработка кожи в месте забора крови на алкоголь производится:**

- а) перекисью водорода
- б) 70% спиртом
- в) раствором риванола
- г) эфиром
- д) спиртосодержащим антисептиком

**30. Достоверные признаки биологической смерти:**

- а) трупные пятна
- б) остановка дыхания
- в) остановка сердца
- г) трупное окоченение
- д) широкий зрачок, не реагирующий на свет

**31. Требования к емкости для сбора мочи для токсикологического исследования:**

- а) чистая сухая
- б) стеклянная
- в) с притертой крышкой
- г) темная не стеклянная
- д) пластиковая с завинчивающейся крышкой

**32. Измерение окружности грудной клетки производят:**

- а) во время вдоха
- б) на высоте максимального вдоха
- в) в состоянии спокойного выдоха
- г) в состоянии максимального выдоха

**33. Перчатки, загрязненные кровью пациента перед снятием, можно обработать:**

- а) 70% этиловым спиртом
- б) 0,02% раствором хлоргексидина
- в) 6% раствором перекиси водорода
- г) 0,01% перманганата калия

**34. Верхним пределом нормального АД считаются цифры:**

- а) 120/80
- б) 139/89
- в) 140/90
- г) 159/94

**35. Турунду для передней тампонады при носовом кровотечении необходимо смочить:**

- а) перекисью водорода
- б) масляным раствором
- в) фурацилином
- г) хлористым кальцием

**36. Кратность измерения АД при первом обследовании пациента:**

- а) 1 раз
- б) 2 раза с интервалом 1 – 2 минуты
- в) 2 раза с интервалом 5 минут
- г) 3 раза с интервалом 1 – 2 минуты
- д) 3 раза с интервалом 5 минут

**37. Госпитализация по направлению участкового врача называется:**

- а) экстренная
- б) срочная
- в) плановая
- г) перевод из другой лечебно-профилактической организации

**38. Возбудитель столбняка:**

- а) анаэробная бактерия
- б) аэробная бактерия
- в) вирус
- г) грибок
- д) риккетсия
- ж) спирохета

**39. Перед проведением обзорной рентгенограммы брюшной полости больному с подозрением на кишечную непроходимость необходимо:**

- а) промыть желудок
- б) поставить клизму
- в) желудок не промывать
- г) клизму не ставить
- д) дать выпить барий

**40. Тяжелобольным санитарная обработка проводится в виде:**

- а) душа
- б) ванны
- в) мытья головы, ног
- г) обтирания

**41. С какой целью при оксигенотерапии проводят увлажнение кислорода:**

- а) предотвращение его излишней потери
- б) соблюдение правил техники безопасности
- в) предупреждение токсического действия кислорода на организм
- г) предупреждение высушивания слизистой

**42. Нормальное содержание глюкозы в крови натощак (в ммоль/л):**

- а) 2,0 – 3,5
- б) 3,5 – 5,5
- в) 5,5 – 6,0
- г) 6,5 – 7,5

**43. Форма журнала для регистрации выявленных случаев педикулеза:**

- а) 001/у
- б) 003/у
- в) 060/у
- г) 066/у

**44. Последовательность мытья пациента:**

- а) голова, верхние конечности, нижние конечности, туловище, промежность
- б) голова, туловище, верхние конечности, нижние конечности, промежность
- в) голова, туловище, верхние конечности, промежность, нижние конечности
- г) голова, верхние конечности, нижние конечности, промежность туловище

**45. К дополнительным формам журналов для работы медицинского персонала приемного отделения относятся:**

- а) журнал учета и расходования наркотических средств
- б) журнал приема больных и отказов в госпитализации
- в) журнал для учета инфекционных больных
- г) журнал регистрации педикулеза
- д) журнал учета приема посетителей

**46. Тактика медсестры приемного отделения при обращении пациента без направления врача:**

- а) вызвать дежурного врача, оказать пациенту необходимую доврачебную помощь
- б) вызвать машину скорой помощи
- в) оказать помощь и отправить в поликлинику за направлением
- г) отказать в госпитализации

**47. При остром холецистите преимущественно боли локализируются в:**

- а) правой подвздошной области
- б) правом подреберье
- в) левом подреберье
- г) эпигастрии

**48. Осложнения гипертензивных кризов:**

- а) легочное кровотечение
- б) инфаркт миокарда
- в) острая почечная недостаточность
- г) острое нарушение мозгового кровообращения
- д) отек легких

**49. Для профилактики постинъекционных абсцессов следует строго соблюдать правила:**

- а) асептики
- б) антисептики

**50. Медицинская деонтология – учение о:**

- а) морали
- б) профессиональном долге
- в) этике
- г) этикете

**51. Документы при приеме пациента в экстренном порядке:**

- а) паспорт
- б) направление из поликлиники
- в) страховой полис
- г) сопроводительный лист «Скорой помощи»
- д) больной может быть без документов

**52. С профилактической целью противостолбнячная сыворотка вводится:**

- а) внутривенно
- б) внутривожно
- в) подкожно, внутримышечно
- г) перорально

**53. Для общей оценки состояния пациента медицинская сестра должна определить следующие показатели:**

- а) антропометрические данные
- б) диурез
- в) положение
- г) сознание
- д) состояние кожи

**54. Характерный симптом острого панкреатита:**

- а) рвота цвета кофейной гущи
- б) опоясывающие боли
- в) симптом Пастернацкого
- г) схваткообразные боли по всему животу

**55. Первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в состоянии шока проводится:**

- а) сразу после поступления
- б) на следующий день
- в) как будет налажено переливании крови
- г) сразу после выведения из шока

**56. «Дегтеобразный» стул характерен для кровотечения из:**

- а) трещины прямой кишки
- б) толстой кишки
- в) желудка
- г) геморроидального узла

**57. Пульсовое давление отражает:**

- а) одновременную регистрацию артериального давления и пульса
- б) разницу между систолическим и диастолическим давлением
- в) уровень давления в манжете, при котором появляется пульсовая волна на лучевой артерии
- г) урежение пульса на выдохе и учащение его на вдохе

**58. В норме частота дыхания составляет (в минуту):**

- а) 8-10
- б) 12-15
- в) 16-18
- г) 16-20

**59. Соотношение введенной и выделенной жидкости за сутки называется:**

- а) суточный диурез
- б) водный баланс

**60. В норме соотношение диуреза к введенной жидкости составляет:**

- а) 100%
- б) 85-95%
- в) 70-80%
- г) 50-60%

**61. Приемное отделение предназначено для:**

- а) санитарно-гигиенической обработки пациентов
- б) предварительного обследования
- в) приема и регистрации пациентов
- г) оказания экстренной помощи
- д) лечения пациентов

**62. Суточный диурез пациента составил 350 мл. Определите вид нарушения мочевыделения:**

- а) анурия
- б) полиурия
- в) олигурия
- г) ишурия

**63. Действия медсестры при стенозирующем ларинготрахеите:**

- а) дать увлажненный кислород
- б) провести отвлекающую терапию
- в) ввести эуфиллин внутривенно
- г) ввести спазмолитики
- д) вызвать врача

**64. Характер сыпи при кори:**

- а) мелкоточечная на фоне гиперемии
- б) слизывающая пятнисто-папулезная на неизменном фоне
- в) розовая крупнопятнистая на ягодицах и разгибательных поверхностях
- г) везикулярная на неизменном фоне

**65. Местные признаки дифтерии зева:**

- а) катаральное воспаление миндалин
- б) фиброзные, плотные налеты, плохо снимающиеся со слизистой миндалин
- в) яркая гиперемия зева
- г) гнойные фолликулы, просвечивающиеся через слизистую миндалин

**66. Какие продукты не разрешается передавать больному ребенку в соматическое отделение:**

- а) соки промышленного производства
- б) пирожное, творог
- в) шоколад
- г) фрукты, ягоды

**67. Клинические признаки прерывания трубной беременности по типу разрыва фаллопиевой трубы:**

- а) боль опоясывающего характера, рвота приносящая облегчение
- б) коллапс, резкие боли внизу живота, положительный симптом раздражения брюшины
- в) резкие боли в животе, многократная рвота, озноб
- г) боли вокруг пупка, симптом раздражения брюшины отрицательный

**68. Противостолбнячная сыворотка вводится при:**

- а) эрозии роговицы
- б) проникающем ранении глазного яблока
- в) ожоге глаза I стадии
- г) ожоге глаза II стадии
- д) острым конъюнктивите

**69. Для вымывания серной пробки из слухового прохода используют воду температурой:**

- а) 22<sup>0</sup>С
- б) 37<sup>0</sup>С
- в) 40<sup>0</sup>С
- г) 45<sup>0</sup>С

**70. При носовом кровотечении пациент должен находиться в положении:**

- а) сидя, голова запрокинута назад
- б) сидя, голова наклонена вперед
- в) лежа на спине, прижав крылья носа
- г) лежа на боку

**71. В зависимости от степени опасности для окружающих выделяют следующие группы пораженных и больных:**

- а) нуждающиеся в специальной (санитарной) обработке (полной или частичной)
- б) нуждающиеся в неотложной медицинской помощи
- в) подлежащие временной изоляции
- г) не нуждающиеся в данный момент в медицинской помощи
- д) представляющие опасности для окружающих

**72. Пострадавшие с наложенным жгутом:**

- а) направляется в операционную в I очередь
- б) направляются в противошоковую
- в) направляются в перевязочную в I очередь
- г) жгут снимается в приемном отделении

**73. Обожженные, не нуждающиеся в неотложных пособиях направляются:**

- а) в перевязочную во II очередь
- б) в операционную во II очередь
- в) в противошоковую
- г) в лечебное отделение

**74. Запас наркотических лекарственных средств у старшей медицинской сестры приемного отделения измеряется в потребности:**

- а) однодневной
- б) трехдневной
- в) десятидневной
- г) месячной

**75. В 1 ампуле преднизолона содержится:**

- а) 20 мг
- б) 30 мг
- в) 40 мг
- г) 60 мг

**76. При поступлении пациента в состоянии средней тяжести работа приемного отделения протекает в следующей последовательности:**

- а) санитарная обработка, регистрация пациента, врачебный осмотр, оказание помощи
- б) регистрация пациента, санитарная обработка, оказание помощи, врачебный осмотр
- в) регистрация пациента, врачебный осмотр, оказание помощи, санитарная обработка
- г) регистрация пациента, врачебный осмотр, санитарная обработка, оказание помощи
- д) последовательность действий медперсонала значения не имеет

**77. Пульсовое давление в норме у взрослого человека:**

- а) 5-10 мм рт. ст.
- б) 35-40 мм рт. ст.
- в) 20-30 мм рт. ст.
- г) 40-55 мм рт. ст.

**78. Экспресс- метод определения белка в моче:**

- а) с сульфасалициловой кислотой
- б) тест-полоской
- в) кипячением
- г) электрофорез

**79. Гемоглобин крови может быть определен:**

- а) в капиллярной крови
- б) в лимфе
- в) в венозной крови
- г) в артериальной крови

**80. Запах ацетона изо рта, наличие сахара в моче характерны для:**

- а) гипогликемической комы
- б) гипергликемической комы
- в) уремической комы
- г) тиреотоксической комы

**81. Пациент с гипертонической болезнью нуждаются в консультации:**

- а) кардиолога
- б) эндокринолога
- в) уролога
- г) окулиста
- д) невролога

**82. Характерные признаки ушиба:**

- а) боль
- б) гиперемия
- в) гематома
- г) патологическая подвижность
- д) отек

**83. Основные клинические проявления вывиха:**

- а) боль
- б) укорочение конечности
- в) ограничение и полное отсутствие движений в суставе
- г) деформация области сустава
- д) патологическая подвижность

**84. Наиболее опасными локализациями при фурункулезе является:**

- а) область груди
- б) область шеи
- в) область носа
- г) область лица
- д) боковая поверхность грудной клетки

**85. Гидраденит – это воспаление желез:**

- а) сальных
- б) апокринных потовых
- в) слюнных
- г) подчелюстных

**86. На коленный сустав накладывают повязку:**

- а) пращевидную
- б) черепашью
- в) косыночную
- г) циркулярную

**87. При повреждении плечевого сустава накладывается повязка:**

- а) циркулярная
- б) возвращающая
- в) колосовидная
- г) спиральная

**88. Атипичные формы инфаркта миокарда:**

- а) уремическая
- б) астматическая
- в) гастралгическая
- г) гипертоническая
- д) церебральная

**89. Пенетрация - это прободение язвы в:**

- а) брюшную полость
- б) соседний орган

**90. При первом обследовании пациента частоту периферического пульса подсчитывают в течение (в секундах):**

- а) 10
- б) 15
- в) 30
- г) 60

**91. Основные клинические признаки перелома:**

- а) патологическая подвижность
- б) припухлость
- в) пружинная фиксация
- г) костная крепитация
- д) наружное кровотечение

**92. За разглашение информации о ВИЧ-инфицированном пациенте медицинский работник:**

- а) не подлежит ответственности
- б) несет уголовную ответственность
- в) несет административную ответственность
- г) подлежит увольнению

**93. Эпидемический очаг прекращает свое существование после:**

- а) госпитализации пациента
- б) заключительной дезинфекции
- в) госпитализации пациента, истечении максимального инкубационного периода и незаболевших контактных
- г) проведения контактным лицам профилактики антибиотиками
- д) госпитализации пациента и выявления всех контактных

**94. Способ транспортировки пациента в отделение определяет:**

- а) медсестра
- б) пациент
- в) врач
- г) санитар

**95. Виды вшей:**

- а) головная
- б) платяная
- в) сыпная
- г) лобковая
- д) подмышечная

**96. Признаки педикулёза:**

- а) наличие гнид
- б) зуд кожных покровов
- в) точечные кровоизлияния
- г) следы расчесов и гнойничковые корки на коже
- д) цианоз кожи
- ж) наличие на коже «входа» и «выхода»

**97. Уничтожение насекомых, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, обозначается термином:**

- а) дезинфекция
- б) дезинтеграция
- в) дезинсекция
- г) дезоксидация

**98. Характерные признаки истерического припадка:**

- а) спонтанность развития
- б) живая реакция зрачков на свет
- в) широкий зрачок, не реагирующий на свет
- г) демонстративность, манерность в поведении
- д) сопротивление осмотру
- ж) нарушение дыхания

**99. Последовательность организации работы приемного отделения при массовом поступлении пострадавших:**

- а) оказание неотложной помощи, сортировка, регистрация, сбор информации, эвакуация в отделение
- б) регистрация пострадавших, оказание неотложной помощи, сбор информации, сортировка, эвакуация в отделение
- в) сортировка, оказание неотложной помощи, регистрация пострадавших, эвакуация в отделение, сбор информации
- г) сортировка, регистрация пострадавших, сбор информации, эвакуация в отделение, оказание неотложной помощи

**100. Последовательность действий медицинской сестры приемного отделения при выявлении пациента с подозрением на заболевание, требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории:**

- а) сбор материала для исследования, сообщение врачу, надевание защитного костюма, оказание неотложной помощи, изоляция пациента
- б) изоляция пациента, надевание защитного костюма, сообщение врачу, оказание неотложной помощи, сбор материала для исследования
- в) изоляция пациента, сообщение врачу, надевание защитного костюма, оказание неотложной помощи, сбор материала для исследования
- г) сообщение врачу, изоляция пациента, надевание защитного костюма, оказание неотложной помощи, сбор материала для исследования