

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1. Наркология - это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая следующие нозологические формы болезней:

- а) алкоголизм, наркомания, токсикомания
- б) склонность к злоупотреблению алкоголем
- в) сердечно – сосудистая патология
- г) психические расстройства

2. В предмет наркологии входит:

- а) изучение проявлений, этиологии и патогенеза наркологических заболеваний, исследование медицинских, психологических, социальных и правовых аспектов этих заболеваний
- б) изучение технологии получения наркотиков
- в) изучение этиологии и патогенеза гепатитов В и С
- г) исследование распространения ВИЧ-инфекции

3. В задачи наркологии входит:

- а) изучение этиологии и патогенеза различных психических расстройств
- б) борьба с незаконным оборотом наркотиков
- в) сравнительный анализ распространенности наркологических заболеваний, планирование и организация наркологической помощи населению
- г) разработка новых наркотических препаратов

4. По отношению к алкоголю население делится на:

- а) устойчивых к алкоголизму
- б) злоупотребляющих и больных алкоголизмом
- в) «любителей» спиртных напитков
- г) выздоровевших от алкоголизма

5. Население по отношению и употреблению наркотических средств делится на:

- а) не употребляющих
- б) «любителей» наркотических средств
- в) выздоровевших от наркомании
- г) резистентных к наркологическим средствам

6. Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся:

- а) наличием бреда
- б) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- в) развитием галлюцинаций
- г) спастическим параличом конечностей

7. Наркомания - это хроническое заболевание:

- а) вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесенных к списку наркотических
- б) характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико-социальных последствий
- в) вызывающее психические и соматические нарушения
- г) вызывающее привыкание и требующее наблюдения и лечения у врача-нарколога

8. Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие критерии:

- а) психологический
- б) политический
- в) морально – этический
- г) медицинский и юридический

9. Понятие "токсикомания" применяется как термин для определения болезни, вызванной злоупотреблением:

- а) веществом или лекарственным средством, способным вызывать зависимость, но не входящим в список наркотиков
- б) наркотическим средством
- в) суррогатами алкоголя
- г) алкоголем

10. К профилактическим формам борьбы с пьянством и алкоголизмом относят:

- а) организацию системы вытрезвителей
- б) пропаганду контролируемого употребления алкоголя
- в) разъяснение вреда, наносимого человеку употреблением алкоголя
- г) запрещение продажи алкогольных напитков

11. К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся:

- а) социально – средовые и личностные
- б) экологические
- в) географические
- г) климатические

12. Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:

- а) крепостью и качеством алкоголя
- б) активностью фермента алкогольдегидрогеназы
- в) культурально – этическими особенностями
- г) поло-возрастными особенностями

13. Укажите средства, относящиеся к наркотическим:

- а) гашиш
- б) акинетон
- в) фенозепам
- г) циклодол

14. Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются:

- а) старшей медсестрой
- б) специальной комиссией
- в) главной медицинской сестрой
- г) заведующим отделением

15. В приемном отделении ЛПУ наркотические средства:

- а) сохраняются три дня
- б) сохраняются пять дней
- в) нужны для оказания экстренной медицинской помощи
- г) не используются вообще

16. Наркотики – это препараты:

- а) вызывающее абстиненцию при однократном приеме
- б) входящие в список наркотических средств
- в) обладающие снотворным действием
- г) обладающие седативным действием

17. При прекращении приема наркотиков у больных развивается:

- а) синдром «рикошета»
- б) абстинентный синдром
- в) психоз
- г) судорожный припадок

18. Абстинентный синдром – это:

- а) физическая зависимость от психоактивного вещества
- б) психическая зависимость от психоактивного вещества
- в) психическое заболевание
- г) изменение резистентности организма

19. Наркоман – это:

- а) больной человек, принимающий наркотические средства
- б) больной человек, имеющий зависимость от употребления наркотиков
- в) здоровый человек, употребляющий наркотические вещества
- г) больной человек, страдающий онкологическим заболеванием

20. Медицинский компонент наркомании означает:

- а) воздействие на центральную нервную систему
- б) использование наркотиков в немедицинских целях
- в) рост заболеваемости
- г) использование наркотиков в медицинских целях

21. Социальный компонент наркомании означает:

- а) использование наркотиков в немедицинских целях
- б) социальные проблемы, связанные с приёмом наркотиков
- в) рост преступности
- г) улучшение экономического благосостояния

22. Соматические расстройства у наркоманов возникают:

- а) в начальной стадии
- б) в стадии истощения
- в) постоянно
- г) в развернутой стадии

23. Узелки по ходу вен свидетельствуют:

- а) о наркотической зависимости
- б) о болезненном состоянии
- в) о варикозном расширении вен
- г) об аллергическом заболевании

24. При выявлении признаков тяжелой наркотической интоксикации человека необходимо:

- а) госпитализировать в ближайшую ЛПО

- б) направить на обследование к психиатру
- в) провести дезинтоксикацию на месте
- г) провести искусственный массаж сердца

25. При малейших признаках наркотической интоксикации человека необходимо:

- а) вызвать бригаду скорой помощи
- б) направить в поликлинику для обследования
- в) направить к наркологу
- г) направить к кардиологу

26. К группе риска по развитию наркомании относятся:

- а) дети из семей пьющих родителей, сироты
- б) мигранты
- в) лица БОМЖ
- г) любые дети

27. Токсикомания – это:

- а) вредная привычка
- б) зависимость от наркотических препаратов
- в) прием различных ядовитых веществ
- г) злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам

28. Морфинизм – это:

- а) хроническое отравление морфием
- б) привыкание нервной ткани к яду
- в) вид наркомании
- г) результат лечения бессонницы

29. Комплайенс - это:

- а) метод психотерапии, позволяющий настроить пациента на активное сотрудничество с персоналом
- б) осознанная готовность пациента к сотрудничеству с врачом, настрой следовать его рекомендациям
- в) пассивное следование больничному режиму, отсутствие замечаний по приему лекарств
- г) осознанная активность пациента, готовность к сотрудничеству с медицинским персоналом в отделении

30. Психосоциальная реабилитация пациентов подразумевает восстановление или формирование недостаточных или утраченных в результате болезни:

- а) когнитивных функций
- б) постоянства внутренней среды организма
- в) психического здоровья
- г) физического здоровья

31. Факторы риска развития наркомании:

- а) социальные
- б) психологические
- в) биологические
- г) географические

32. Все листы журнала учета наркотических препаратов должны быть:

- а) пронумерованы, прошнурованы, опломбированы и заверены подписью руководителя учреждения
- б) заверены подписью руководителя учреждения или его заместителя
- в) заверены подписью главной медсестры
- г) просто пронумерованы

33. Наркоманию вызывает злоупотребление:

- а) препаратами опия, конопли
- б) элениумом
- в) налоксоном
- г) феназепамом

34. Токсикоманию вызывает злоупотребление:

- а) снотворными и транквилизаторами
- б) алкоголем
- в) слабоалкогольными напитками
- г) «лёгкими» наркотиками

35. Полинаркомания – это:

- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотиками
- б) повышение дозы наркотического вещества
- в) алкоголизм
- г) токсикомания

36. Иллюзии относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

37. Галлюцинации относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

38. Навязчивые идеи относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

39. Сверхценные идеи относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

40. Бредовые идеи относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия

- в) интеллекта
- г) влечений

41. Делирий относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) сознания

42. Онейроид относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) сознания

43. Амбулаторные автоматизмы относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) сознания
- г) интеллекта

44. Трансы относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) сознания
- в) восприятия
- г) интеллекта

45. Оглушение относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) сознания

46. Сопор относится к расстройствам:

- а) сознания
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) мышления

47. Кома относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) сознания

48. Деменция относятся к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

49. Олигофрения относится к расстройствам:

- а) мышления
- б) восприятия
- в) интеллекта
- г) влечений

50. Депрессия включает в себя:

- а) моторную заторможенность
- б) повышенный фон настроения
- в) навязчивости
- г) ускорение темпа мышления

51. Маниакальное состояние включает:

- а) моторную расторможенность
- б) резонерство
- в) сниженный фон настроения
- г) замедление темпа мышления

52. Первая помощь при передозировке опиатов заключается в:

- а) введении реланиума
- б) введении налоксона
- в) введении галоперидола
- г) срочном вызове бригады скорой помощи

53. Объективными признаками наличия галлюцинаций являются:

- а) поведение больного, его внешний вид, высказывания
- б) склонность пациента к конфликтам
- в) дрожь в теле
- г) помрачение сознания

54. Журнал наблюдения за больными в отделении заполняется медсестрой:

- а) один раз в сутки
- б) два раза в сутки
- в) три раза в сутки
- г) один раз в неделю

55. Сведения о больных, находящихся в наркологическом отделении, сообщаются по телефону:

- а) всем обращающимся
- б) только родственникам
- в) только сотрудникам правоохранительных органов
- г) никому не сообщаются

56. Абстинентный синдром при наркомании возникает вследствие:

- а) присутствия наркотика в организме
- б) прекращения поступления наркотика в организм
- в) выраженных соматоневрологических нарушений в организме
- г) отсутствия сна и аппетита

57. Принудительное лечение это:

- а) насильственное лечение и кормление больного
- б) лечение, назначенное по приговору суда, в соответствии с существующим законодательством
- в) фиксация больного в период психомоторного возбуждения
- г) лечение больного по заявлению родственников

58. К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относится:

- а) наследственность
- б) предменструальное напряжение
- в) ранняя психическая травматизация
- г) соматические заболевания

59. Для подросткового возраста наиболее характерны:

- а) тяга к знаниям
- б) реакция эмансипации
- в) реакция группирования со сверстниками
- г) стремление к одиночеству

60. Самой частой причиной дыхательных расстройств при отравлении снотворными является:

- а) бронхоспазм
- б) аспирация рвотных масс
- в) угнетение дыхательного центра
- г) бронхорея

61. Рецидив алкоголизма – это возобновление приёма алкоголя в период ремиссии с:

- а) продолжительностью более одного дня
- б) выпивкой более 20 г в пересчёте на чистый алкоголь
- в) обострением симптомов влечения к алкоголю
- г) появлением признаков повышенной возбудимости

62. ЛСД относится к:

- а) психостимуляторам
- б) производным конопли
- в) галлюциногенам
- г) опиатам

63. По медицинским показаниям наркотики назначают:

- а) онкологическим пациентам
- б) терапевтическим пациентам
- в) стоматологическим пациентам
- г) наркологическим пациентам

64. Злоупотребление сильнодействующими препаратами называется:

- а) токсикоманией
- б) вредной привычкой
- в) наркотической зависимостью
- г) алкоголизмом

65. Стигма в области наркологии - это:

- а) один из симптомов психического расстройства
- б) предубеждение по отношению к пациентам
- в) состояние, связанное с полным отсутствием интереса к жизни
- г) состояние, связанное с недовольством собственной внешностью

66. Острая опийная интоксикация обычно характеризуется:

- а) дисфорией
- б) депрессией
- в) эйфорией
- г) галлюцинациями

67. К группе риска по развитию наркомании относятся:

- а) дети, подростки из неполных семей
- б) сироты
- в) дети семей курящих родителей
- г) подростки с нарушением психики, внимания, памяти

68. Иллюзии, выражающиеся в восприятии действительно существующих образов изменено, обычно в причудливо – фантастическом виде, называются:

- а) аффективными
- б) парейдолическими
- в) вербальными
- г) иллюзиями невнимания

69. Определение реабилитационного потенциала необходимо для:

- а) реализации способностей пациента
- б) борьбы с осложнениями
- в) составления плана лечения
- г) составления плана сестринского ухода

70. При отказе пациента от процедуры медицинская сестра давать разъяснения пациенту:

- а) обязана в пределах своей компетенции
- б) не имеет права ни при каких условиях
- в) имеет право с разрешения врача
- г) не обязана

71. Гашишизм – это:

- а) наркомания
- б) табакокурение
- в) психическое заболевание, возникающее у любого наркомана
- г) курение кальяна

72. Кустарно изготовленный первитин относится к:

- а) опиатам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) барбитуратам

73. Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при наркомании:

- а) 1 год
- б) 3 года
- в) 5 лет

г) пожизненно

74. Наркотики – это препараты:

- а) вызывающие психическую зависимость при длительном употреблении
- б) обладающие снотворным действием
- в) обладающие седативным действием
- г) обладающие жаропонижающим действием

75. К опиийной группе наркотиков относится:

- а) морфин
- б) гашиш
- в) амфетамин
- г) ЛСД

76. Деградация личности при наркомании развивается:

- а) при приеме наркотиков
- б) в развернутой стадии
- в) в стадии истощения
- г) при абстиненции

77. Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя:

- а) проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
- б) назначение антибиотиков
- в) проведение «кодирования»
- г) проведение сеансов гипноза

78. Назовите стадии алкоголизма:

- а) пивная, винная, водочная
- б) зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация
- в) галлюциноз, делирий и параноид
- г) похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры

79. Принудительное лечение – это:

- а) насильственное лечение и кормление пациента
- б) лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера
- в) фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим
- г) изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении

80. Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в наркологическом стационаре:

- а) фиксировать с помощью медперсонала
- б) фиксировать на время не более 6 часов
- в) получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
- г) сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение часа

81. Абстиненция при наркомании – это:

- а) отсутствие наркотика в организме
- б) иллюзорное восприятие окружающего мира
- в) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления наркотика в организм

г) отсутствие аппетита у наркомана

82. Интеллектуально – мнестические расстройства при алкоголизме обычно возникают:

- а) в первой стадии заболевания
- б) в переходной от первого ко второй стадии
- в) во второй стадии
- г) в третьей стадии

83. Эфедрон чаще всего употребляется:

- а) внутривенно
- б) внутримышечно
- в) перорально
- г) путем курения

84. Кокаин относится к:

- а) сильнодействующим средствам
- б) седативным препаратам
- в) психостимуляторам
- г) галлюциногенам

85. Метадон является:

- а) нейролептиком
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногеном
- г) опиоидным производным

86. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для наркомании:

- а) барбитуровой
- б) гашишной
- в) эфедроновой
- г) опиоидной

87. К расстройствам восприятия относятся:

- а) амнезия, абулия, афазия
- б) резонерство, навязчивость
- в) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
- г) амбивалентность, амбигуальность

88. Недобровольная госпитализация в наркологический стационар – это:

- а) возражение пациента против госпитализации
- б) госпитализация пациента без его согласия
- в) госпитализация пациента старше 15 лет без согласия его родственников
- г) госпитализация пациента бригадой скорой помощи

89. Основные признаки астенического синдрома:

- а) абулия, афазия, амнезия
- б) бессонница, беспокойство, бродяжничество
- в) утомляемость, раздражительность, бессонница
- г) анорексия, негативизм, сонливость

90. К нарушениям памяти относятся:

- а) ментизм, шперрунг, обстоятельность
- б) кратковременная и долговременная память
- в) резонерство, разорванность мышления
- г) амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции

91. Иллюзии – это:

- а) искаженное восприятие реально существующего предмета
- б) действия иллюзиониста
- в) голоса, носящие «приказной» императивный характер
- г) выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности

92. Невменяемость – это:

- а) неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- б) неспособность говорить и отвечать на вопросы
- в) высокая степень алкогольного опьянения
- г) выраженное слабоумие

93. К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся:

- а) бессонница, раздражительность, депрессия
- б) корсаковский психоз, энцефалопатия Гайе-Верника
- в) алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
- г) деменция, амнезия, афазия

94. Сужение зрачков характерно для:

- а) опишной интоксикации
- б) гашишной интоксикации
- в) эфедроновой интоксикации
- г) опишного абстинентного синдрома

95. К основным признакам алкогольного галлюциноза относится:

- а) помрачение сознания
- б) полная амнезия
- в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
- г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

96. Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотика
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь

97. К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся:

- а) повышенное настроение
- б) страх, тревога, бред преследования
- в) галлюцинации
- г) судорожные припадки

98. К основным симптомам Корсаковского психоза относятся:

- а) полиневриты, амнезия, конфабуляции
- б) зрительные галлюцинации
- в) депрессия
- г) анорексия

99. Наркоманы, отказывающиеся от лечения:

- а) подвергаются уголовной ответственности
- б) к ответственности не привлекаются
- в) подвергаются принудительному лечению
- г) привлекаются к поддерживающей терапии транквилизаторами

100. Эпилептический статус – это:

- а) серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- б) оформление документов на инвалидность больному эпилепсией
- в) речедвигательная заторможенность больного эпилепсией
- г) невозможность больному эпилепсией водить автомобиль

101. Галлюцинации – это:

- а) яркие фантастические сновидения
- б) крайне неприятные ощущения жжения, стягивания
- в) ложное восприятие несуществующего объекта
- г) световые вспышки при проведении электроэнцефалографии

102. К основным формам алкогольных психозов относятся:

- а) алкогольная горячка, алкогольное возбуждение, алкогольный озноб
- б) алкогольный делирий, галлюциноз, параноид
- в) спокойный, похмельный, смешанный
- г) бред ревности, бред преследования, бред отрицания болезни

103. Пациенты с суицидальными намерениями и мыслями нуждаются в:

- а) строгом наблюдении
- б) общем наблюдении
- в) амбулаторном лечении
- г) диспансерном наблюдении

104. К неотложным доврачебным мероприятиям при отравлении циклодолом относится:

- а) искусственная вентиляция легких
- б) дезинтоксикация
- в) промывание желудка
- г) внутривенное введение 100 мл 40% глюкозы и витаминотерапия

105. В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует:

- а) опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
- б) ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
- в) провести не менее двух проб на алкоголь
- г) ориентироваться на утверждение очевидцев

106. Среди женщин, больных алкоголизмом, преобладают лица, занятые в:

- а) торговле, сфере услуг
- б) промышленности
- в) здравоохранении

г) народном образовании

107. Алкогольная абстиненция – это:

- а) присутствие алкоголя в крови
- б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
- в) алкогольное поражение печени
- г) алкогольная эпилепсия

108. Запись о введении наркотических средств необходимо сделать в:

- а) листе назначений
- б) журнале учета наркотических средств
- в) истории болезни
- г) журнале учета наркотических средств и истории болезни

109. Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется:

- а) мозжечковой атаксией, мышечной атонией, амимией, вестибулярными расстройствами
- б) дисфорией
- в) повышенным настроением с дурашливостью
- г) высоким АД

110. Для третьей стадии алкоголизма характерны:

- а) снижение толерантности к алкоголю
- б) повышение толерантности к алкоголю
- в) увеличение сроков запоев
- г) исчезновение толерантности

111. Тоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:

- а) 5 – 15 секунд
- б) 1 – 3 минуты
- в) 3 – 5 минут
- г) 5 – 10 минут

112. Доврачебные мероприятия при ортостатическом коллапсе у пациента, получающего нейролептики:

- а) внутримышечное введение аминазина
- б) уложить пациента с приподнятым ножным концом
- в) отменить нейролептики
- г) наложить жгут на нижние конечности

113. При паркинсонизме, возникшем в результате лечения психотропными препаратами, назначают:

- а) корректоры
- б) нейролептики
- в) антидепрессанты
- г) седативные средства

114. Нарушения мышления по форме:

- а) депрессия
- б) резонерство
- в) деменция

г) дурашливость

115. Нарушения мышления по содержанию:

- а) навязчивости
- б) гипестезии
- в) амнезия
- г) эйфория

116. Проявление паранойяльного синдрома:

- а) амнезия
- б) ступор
- в) сутяжничество
- г) деменция

117. При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести:

- а) мажептил
- б) аминазин
- в) седуксен
- г) модитен – депо

118. Клоническая фаза развернутого эпилептического припадка продолжается:

- а) 10 – 15 секунд
- б) 1 – 3 минуты
- в) 3 – 5 минут
- г) 5 – 10 минут

119. Проявление судорожного синдрома:

- а) припадок
- б) дереализация
- в) амбивалентность
- г) сенестопатии

120. Проявление расстройства интеллекта:

- а) оглушение
- б) амбитендентность
- в) слабоумие
- г) дисфория

121. Проявление расстройства памяти:

- а) деменция
- б) амнезия
- в) галлюцинации
- г) абулия

122. Проявление аффективного синдрома:

- а) депрессия
- б) деменция
- в) слабоумие
- г) гипермнезия

123. Проявление кататонического синдрома:

- а) галлюциноз
- б) негативизм

- в) мания
- г) амнезия

124. Социальные последствия у больных с III стадией алкоголизма проявляются в:

- а) овладение другой профессией
- б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации и иждивенческих тенденциях
- в) переходе на работу, связанную с индивидуальным трудом
- г) переезде из города в деревню

125. Показаниями для назначения ноотропов у больных алкоголизмом является:

- а) атипичная форма опьянения
- б) нарушение памяти и интеллекта
- в) наличие депрессивных расстройств
- г) выраженные соматические осложнения

126. При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики:

- а) с преобладанием антипсихотического эффекта
- б) с преобладанием седативного эффекта
- в) с преобладанием стимулирующего средства
- г) нейролептики не используются

127. Проявление невротического синдрома:

- а) астения
- б) слабоумие
- в) оглушение
- г) идеи величия

128. Проявление психопатического синдрома:

- а) транс
- б) вспыльчивость
- в) эйфория
- г) иллюзии

129. Проявление сумеречного состояния сознания:

- а) транс
- б) дурашливость
- в) ступор
- г) мания

130. Проявление ипохондрического синдрома:

- а) повышенное настроение
- б) онейроид
- в) сенестопатии
- г) амбивалентность

131. Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:

- а) редких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- б) традиционных, социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- в) псевдозапоях

г) развитию бреда ревности

132. Дипсомания – это:

- а) запои
- б) депрессивно – тревожный фон настроения
- в) расстройства функции желудочно-кишечного тракта
- г) агрессивность

133. Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме:

- а) 1 год
- б) 3 года
- в) 5 лет
- г) пожизненно

134. Для абстиненции при употреблении галлюциногенов характерны:

- а) зрительные галлюцинации
- б) бредовые проявления
- в) слабость, сонливость
- г) подергивание мышц лица

135. Клиническими признаками наркоманий при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:

- а) приподнятое настроение
- б) повышение работоспособности
- в) болтливость
- г) острые бредовые состояния

136. Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:

- а) гипергидроз, тремор
- б) отвращение к алкоголю
- в) сонливость
- г) влечение к опохмелению

137. Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:

- а) расстройство поведения
- б) расстройство сознания и ориентировки
- в) нарушение походки
- г) галлюцинации

138. Согласно классификации Портнова, для начальной стадии алкоголизма характерно:

- а) навязчивое влечение к алкоголю
- б) снижение толерантности к алкоголю
- в) повышение толерантности к алкоголю
- г) абстинентный синдром

139. Для начальной стадии алкоголизма характерно:

- а) отсутствие тяги к алкоголю
- б) обсессивное влечение к алкоголю
- в) компульсивное влечение к алкоголю
- г) абстинентный синдром

140. Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

- а) в первой стадии заболевания
- б) во второй стадии заболевания
- в) в третьей стадии заболевания
- г) на любой стадии заболевания

141. Снижение количественного контроля принятого алкоголя во второй стадии заболевания проявляется в:

- а) повышении толерантности к алкоголю
- б) понижении толерантности к алкоголю
- в) непреодолимом влечении к последующему приему алкоголя после употребления начальной (критической) дозы
- г) развитию алкогольного делирия

142. Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма:

- а) встречаются крайне редко
- б) носят тотальный характер
- в) носят систематический характер
- г) отсутствуют

143. Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма:

- а) встречаются крайне редко
- б) носят тотальный характер
- в) носят систематический характер
- г) отсутствуют

144. Первая степень тяжести алкогольного абстинентного синдрома характеризуется преобладанием расстройств:

- а) вегетативно – астенических
- б) психических
- в) неврологических
- г) сердечно – сосудистых

145. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома I степени тяжести:

- а) до суток
- б) 2 – 5 суток
- в) 6 – 7 суток
- г) до 10 суток

146. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести:

- а) до суток
- б) 2 – 5 суток
- в) 6 – 7 суток
- г) до 10 суток

147. Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:

- а) до 18 лет
- б) до 25 лет
- в) до 30 лет
- г) внутриутробного развития плода

148. Нарушения памяти у больных алкоголизмом III стадии болезни:

- а) необратимы
- б) обратимы после купирования антиалкогольными средствами
- в) обратимы при условии лечения и воздержания от алкоголя более 1 года
- г) обратимы при приеме ноотропов

149. Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается после последнего приема наркотика через:

- а) сутки
- б) 8 – 12 часов
- в) 48 – 72 часа
- г) 5 суток

150. Промывание желудка при острых пероральных отравлениях показано:

- а) если прошло не больше двух часов после приема яда
- б) если прошло не более 10 часов после приема яда
- в) при бессознательном состоянии пациента
- г) при любых острых пероральных отравлениях

151. Объем воды, необходимой для эффективного промывания желудка взрослому человеку, составляет:

- а) 6 литров
- б) 8 литров
- в) 10 литров
- г) 20 литров

152. Антидотом при отравлении наркотиками является:

- а) атропин
- б) налоксон
- в) прозерин
- г) унитиол

153. Объем однократно вводимой жидкости при зондовом промывании желудка взрослому пациенту составляет:

- а) 300 мл
- б) 500 мл
- в) 900 мл
- г) 1000 мл

154. Биотрансформация алкоголя происходит в:

- а) печени
- б) почках
- в) центральной нервной системе
- г) желудке

155. Путем биотрансформации из организма удаляется:

- а) 50% введенного алкоголя
- б) 75% введенного алкоголя
- в) 80 – 95% введенного алкоголя
- г) 100% введенного алкоголя

156. При III степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают расстройства:

- а) психические
- б) вегетативно – соматические
- в) неврологические
- г) сердечно – сосудистые

157. Алкогольные амнезии у больных в I стадии алкоголизма:

- а) отсутствуют
- б) носят тотальный характер
- в) носят систематический характер
- г) встречаются крайне редко

158. Обсессивное влечение к алкоголю отражает:

- а) психическую зависимость от алкоголя
- б) физическую зависимость от алкоголя
- в) генетическую предрасположенность к алкоголю
- г) социально обусловленное желание

159. Повышение толерантности к алкоголю проявляется:

- а) необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
- б) достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя
- в) более редким желанием употреблять алкоголь
- г) более частым желанием употреблять алкоголь

160. О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно свидетельствует следующий показатель:

- а) рождаемость
- б) смертность
- в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- г) количество состоящих на учете больных алкоголизмом