

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1.Анатомические отделы органа слуха, участвующие в проведении звука - это:

- а) наружный слуховой проход
- б) среднее ухо
- в) перелимфа лестницы преддверия и барабанной лестницы
- г) проводящие пути
- д) ушная раковина

2.К аномалиям развития наружного уха относится:

- а) атрезия хоан
- б) незаращения твердого нёба
- в) микротия
- г) анкилоз стремени

3.Первая помощь при носовом кровотечении:

- а) усадить больного
- б) уложить больного
- в) холод на переносицу
- г) ватный шарик с 3% перекисью водорода в полость носа
- д) тампон с адреналином в полость носа

4.В состав системы среднего уха входит:

- а) барабанная полость
- б) сосцевидный отросток
- в) слуховая труба
- г) сигмовидный синус
- д) пирамида височной кости

5.На консультацию к фониатру направляется пациент по поводу:

- а) снижения слуха
- б) изменений голоса
- в) нарушения вестибулярного аппарата
- г) нарушения акта глотания

6.Носовое кровотечение могут вызвать:

- а) повышение АД
- б) болезни крови
- в) перенесенная вирусная инфекция
- г) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
- д) варикозная болезнь

7.Симптомы ангины:

- а) боль при глотании с обеих сторон
- б) высокая температура и озноб
- в) налеты на миндалинах
- г) невозможность глотать пищу
- д) ларингоспазм

8.Симптомы острого фарингита:

- а) боль при глотании слюны, першение в глотке
- б) охриплость
- в) ощущение кома в глотке
- г) повышение температуры
- д) ларингоспазм

9.Симптомы стеноза гортани:

- а) затрудненный вдох
- б) затрудненный выдох
- в) участие в акте вспомогательной мускулатуры
- г) стридорозное дыхание
- д) боль при глотании

10.К сурдологу направляется пациент с:

- а) тугоухостью
- б) аллергическими реакциями
- в) нарушениями дыхания
- г) изменением голоса

11.Первая помощь при ушибе носа:

- а) троксевазиновая мазь
- б) холод на место ушиба
- в) согревающий компресс
- г) постельный режим
- д) турунды с адреналином

12.Заболевание, при котором нарушается подвижность стремечка:

- а) болезнь Меньера
- б) острый отит
- в) хронический средний отит
- г) отосклероз

13.В каждой половине носа имеется носовых ходов:

- а) три
- б) два
- в) четыре
- г) пять

14.Инородные тела носа удаляются:

- а) шприцем Жане
- б) пинцетом
- в) набором крючков
- г) иглой Куликовского

15.Признаки хронического гайморита:

- а) упорные головные боли
- б) затемнение верхне-челюстных пазух на R-графии
- в) периодические гнойные выделения из носа
- г) менингеальные знаки
- д) обильные водянистые выделения из носа

16.Симптомы сенсоневральной тугоухости:

- а) снижение слуха
- б) снижение разборчивости речи
- в) наличие костно-воздушного разрыва на аудиограмме
- г) шум в ухе
- д) боль в ухе

17.Нарушение обоняния – это:

- а) афония
- б) атрезия
- в) anosmia
- г) амвроз

18.При развитии отогенного менингита общее состояние больного:

- а) средней тяжести
- б) очень тяжелое
- в) удовлетворительное
- г) не вызывает опасения

19.Одонтогенный левосторонний гайморит развивается при патологии зубов:

- а) верхней челюсти справа
- б) верхней челюсти слева
- в) нижней челюсти справа
- г) нижней челюсти слева

20.Носовые ходы ограничены следующими образованиями:

- а) средней носовой раковиной
- б) носовой перегородкой
- в) верхней носовой раковиной
- г) носоглоточной миндалиной
- д) Евстахиевой трубой

21.К околоносовым относятся пазухи (синусы):

- а) верхнечелюстные
- б) сигмовидная
- в) лобные
- г) клиновидная
- д) пещеристая

22.К гортани относятся:

- а) щитовидный хрящ
- б) подъязычная кость
- в) перстневидный хрящ
- г) черпаловидный хрящ
- д) коническая связка

23.Аденоиды расположены в:

- а) полости носа
- б) носоглотке
- в) ротоглотке
- г) Евстахиевой трубе

24. Функции гортани:

- а) голосообразование
- б) дыхательная
- в) защитная
- г) адаптационная
- д) пищепроводная

25. Ушная ликворея возникает при:

- а) переломе основания черепа и височной кости
- б) травмах небных миндалин
- в) травмах носа
- г) травмах уха

26. При среднем отите, кроме барабанной полости, в воспалительный процесс вовлекаются:

- а) костный отдел слухового прохода, слуховая труба
- б) ячейки сосцевидного отростка, лабиринт
- в) слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка
- г) лабиринт, костный отдел слухового прохода

27. Сосудосуживающие капли в нос можно применять в течение:

- а) 5 дней
- б) 7 дней
- в) 14 дней
- г) 1 месяц

28. Туалет уха, введение турунд с лекарственными веществами в слуховой проход, применение сосудосуживающих капель в нос, продувание слуховых труб по Политцеру применяется в комплексе для лечения:

- а) отомикоза
- б) фурункула уха
- в) острого среднего отита
- г) мастоидита

29. Парез лицевого нерва при остром среднем отите:

- а) возможен
- б) не возможен
- в) возникает только после инструментального вмешательства

30. При профессиональной тугоухости преимущественно происходит поражение в системе:

- а) наружного уха
- б) среднего уха
- в) внутреннего уха

31. К осложнениям попадания инородных тел в гортань относится:

- а) аносмия
- б) тубоотит
- в) носовое кровотечение
- г) пневмония

32.Для продувания слуховых труб по Политцеру понадобится:

- а) шпатель
- б) ушная воронка
- в) резиновая груша с оливой
- г) шприц

33.Операция на среднем ухе показана при:

- а) мезотимпаните
- б) эптитимпаните
- в) мастоидите
- г) антрите

34.Симптомы эптитимпанита:

- а) гнойное отделяемое с запахом
- б) боль в ухе
- в) центральная перфорация
- г) перфорация в ненатянутой части перепонки
- д) повышение температуры

35.При нейросенсорной тугоухости в ушах отмечается шум:

- а) высокой тональности
- б) низкой тональности
- в) средней тональности

36.Решающим признаком болезни Меньера является наличие:

- а) приступов головокружения
- б) приступов тошноты
- в) приступов светобоязни
- г) заложенности носа

37.Метод лечения гипертрофического ринита:

- а) медикаментозное (сосудосуживающие капли)
- б) оперативное лечение
- в) электрофорез
- г) лазеротерапия

38.При ангине больного госпитализируют в отделение:

- а) ЛОР
- б) инфекционное
- в) терапевтическое
- г) по уходу

39.При остром катаральном ларингите рекомендован голосовой режим:

- а) строгий
- б) шепотная речь
- в) обычный

40.Носовые полипы чаще всего растут из клеток:

- а) решетчатого лабиринта
- б) обонятельных луковиц
- в) бокаловидных желез
- г) соединительной ткани

41.К отделам глотки относятся:

- а) носоглотка
- б) ротоглотка
- в) гортаноглотка
- г) язычная миндалина

42.Группы антибиотиков с ототоксическим эффектом:

- а) аминогликозиды
- б) макролиды
- в) пенициллины
- г) цефалоспорины

43.Отосклероз – это заболевание, связанное с:

- а) гнойным процессом в ухе
- б) катаральным процессом в ухе
- в) дистрофическим процессом
- г) нарушением иннервации

44.Острый тубоотит может быть следствием:

- а) ангины
- б) острого ринита
- в) аденоидита
- г) бронхита
- д) отосклероза

45.Пресбиакузис – это патология лиц возраста:

- а) детского
- б) молодого
- в) среднего
- г) пожилого

46.При катаральном ларингите выявляется:

- а) дисфагия
- б) дисфония
- в) дыхательная недостаточность
- г) кашель
- д) стридорозное дыхание

47.При ударе подбородком часто происходит перелом:

- а) верхней челюсти
- б) нижней челюсти
- в) верхней стенки слухового прохода
- г) передней стенки слухового прохода

48.Характерные симптомы для начального периода острого среднего отита:

- а) боль в ухе
- б) снижение слуха
- в) повышение температуры
- г) гноетечение
- д) головокружение

49. Пути проникновения возбудителя инфекции в барабанную полость:

- а) тубогенный
- б) гематогенный
- в) из наружного слухового прохода
- г) лимфогенный
- д) контактно-бытовой

50. Постепенная потеря слуха в обоих ушах, как признак атрофических возрастных изменений, обозначается термином:

- а) пресбиопия
- б) пресбиакузис
- в) престариум
- г) пресбиофрения

51. Анатомические отделы органа слуха, участвующие в звуковосприятии:

- а) кортиева орган
- б) проводящие пути
- в) зона коры головного мозга
- г) барабанная перепонка
- д) слуховая косточка

52. Аденомотомия - это удаление:

- а) небных миндалин
- б) носоглоточной миндалины
- в) язычной миндалины
- г) полипов носа

53. Заболевание, характеризующееся пароксизмальным чиханием, обильным прозрачным водянистым отделяемым из носа, заложенностью носа, зудом в области носа, называется:

- а) острый ринит
- б) острый синусит
- в) аллергический ринит
- г) атрофический ринит

54. Слои барабанной перепонки:

- а) эпидермальный
- б) фиброзный
- в) эндотелиальный
- г) эпителиальный
- д) слизистый

55. Устье слуховой трубы располагается в:

- а) боковой стенке носоглотки
- б) задней стенке носоглотки
- в) области хоан
- г) своде носоглотки

56.Стремечко состоит из:

- а) головки
- б) двух ножек
- в) основания
- г) короткого отростка
- д) седла

57.При живом инородном теле слухового прохода следует закапать в ухо:

- а) борный спирт
- б) масло
- в) раствор перманганата калия
- г) раствор фурацилина

58.Пороговым звуком называется звук:

- а) достаточный по громкости, чтобы услышать
- б) вызывающий неприятные ощущения
- в) вызывающий комфортные ощущения
- г) вызывающий болевые ощущения

59.Основные функции носа:

- а) дыхательная
- б) обонятельная
- в) защитная
- г) резонаторная
- д) вестибулярная

60.К среднему уху относятся:

- а) барабанная перепонка
- б) слуховые косточки
- в) улитка
- г) слуховая труба
- д) седло

61.Для обострения хронического гнойного среднего отита характерны признаки:

- а) отсутствие гноетечения из уха
- б) наличие стойкой перфорации барабанной перепонки
- в) снижение слуха
- г) усиление гноетечения из уха
- д) появление шума в ушах

62.Отогенный менингит чаще встречается при:

- а) хронических гнойных средних отитах
- б) острых синуситах
- в) наружных отитах
- г) лабиринтитах (внутренних отитах)

63.Здоровый молодой человек воспринимает шепотную речь не менее чем с (в метрах):

- а) 3
- б) 5
- в) 6
- г) 10

64. Латерализация звука от камертона, поставленного в области темени у больного с перфорацией барабанной перепонки, происходит в:

- а) больное ухо
- б) здоровое ухо
- в) оба уха

65. Признаки острого фронтита:

- а) боль, локализующаяся в области лба
- б) гнойные выделения из носа
- в) болезненность при пальпации верхнечелюстных пазух
- г) снижение пневматизации на R-грамме лобных пазух
- д) слизистые выделения из носа

66. Симптомы хронического ларингита:

- а) периодически возникающая охриплость
- б) затруднение дыхания
- в) быстрая утомляемость голоса
- г) боль при глотании

67. Симптомы острого насморка (ринита):

- а) зуд в области преддверия носа
- б) затруднение носового дыхания
- в) слизистые выделения из носа
- г) температура 39-40°C
- д) гнойные выделения из носа

68. Профессиональная тугоухость развивается:

- а) у лиц, длительное время работающих в условиях шума, превышающего ПДУ (предельно допустимый уровень)
- б) при однократном воздействии интенсивного шума
- в) в старческом возрасте
- г) после приема ототоксических антибиотиков

69. При евстахиите развивается тугоухость:

- а) кондуктивная
- б) нейросенсорная
- в) смешанная

70. Ротоглотка состоит из следующих анатомических образований:

- а) небная занавеска
- б) небные миндалины
- в) надгортанник
- г) язычок
- д) гортань

71. Наружное ухо состоит из следующих образований:

- а) наружный слуховой проход
- б) ушная раковина
- в) сустав нижней челюсти
- г) барабанная перепонка
- д) стремечко

72.Кольцо Пирогова или глоточное кольцо состоит из следующих образований:

- а) глоточные миндалины
- б) язычные миндалины
- в) пейеровы бляшки
- г) носоглоточные миндалины
- д) трубные миндалины

73.Функции уха:

- а) звуковосприятие
- б) защитная
- в) сохранение равновесия
- г) ориентация в пространстве
- д) резонаторная

74.Коникотомия - это:

- а) рассечение трахеи
- б) вскрытие паратонзиллярного пространства
- в) рассечение связки между перстневидным и щитовидным хрящами
- г) рассечение уздечки языка

75.Температура воды, применяемая для промывания уха с целью удаления серной пробки, должна быть (в градусах по Цельсию):

- а) 18
- б) 20
- в) 37
- г) 45

76.Вторичный острый средний отит развивается после инфекционных заболеваний, таких как:

- а) скарлатина
- б) корь
- в) краснуха
- г) дифтерия
- д) коклюш

77.Прокол барабанной перепонки (парацентез) применяется при:

- а) остром среднем отите
- б) абсцедирующем фурункуле слухового прохода
- в) отосклерозе
- г) лабиринтите
- д) туботите

78.Больному, перенесшему паратонзиллярный абсцесс, показана операция:

- а) тонзиллэктомия
- б) коникотомия
- в) аденомэктомия
- г) ларингоэктомия

79.К симптомам инородного тела гортани относятся:

- а) дисфагия
- б) дисфония
- в) кашель
- г) саливация
- д) стеноз

80.Отогенные внутричерепные осложнения чаще возникают при:

- а) адгезивном среднем отите
- б) отосклерозе
- в) хроническом гнойном эпитемпаните и остром среднем отите
- г) хроническом мезотимпаните

81.Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в проявлении:

- а) амавроза
- б) нистагма
- в) птоза
- г) экзофтальма

82.Фурункул носа может дать осложнения:

- а) тромбоз пещеристого синуса
- б) сепсис
- в) гайморит
- г) фронтит
- д) туботит

83.Первый приступ болезни Меньера обычно возникает у лиц возраста:

- а) детского
- б) молодого
- в) среднего
- г) пожилого

84.При остром среднем отите возможны осложнения:

- а) гнойный менингит
- б) абсцесс мозга
- в) мастоидит
- г) паратонзиллярный абсцесс
- д) евстахиит

85.Седловидный нос является следствием:

- а) туберкулеза
- б) злоупотребления кокаином
- в) сифилиса
- г) ринофимы
- д) травмы носа

86.К симптомам поллиноза относятся:

- а) гнойные выделения из носовых ходов
- б) обильные водянистые выделения из носовых ходов
- в) повышение температуры тела до 38-40°С
- г) аллергический конъюнктивит
- д) многократное чихание

87.Первая помощь при инородном теле глотки на догоспитальном этапе:

- а) в момент кашля произвести короткие удары в межлопаточное пространство
- б) заесть кусочком хлеба
- в) попытаться достать инородное тело
- г) прополоскать горло

88.Осложнения, наиболее часто встречающиеся при остром среднем отите:

- а) мастоидит
- б) отосклероз
- в) парез лицевого нерва
- г) менингит

89.Основные исходы острого среднего отита:

- а) выздоровление
- б) адгезивный процесс
- в) хронический процесс
- г) осложнения
- д) атрезия слухового прохода

90.Осмотр глотки - это:

- а) отоскопия
- б) риноскопия
- в) ларингоскопия
- г) фарингоскопия

91.Основными физиологическими функциями глотки являются:

- а) речеобразовательная
- б) дыхательная
- в) защитная
- г) адаптационная
- д) пищепроводная

92.Длина свободных концов ниток тампона, предназначенного для задней тампонады носа (в сантиметрах):

- а) 70-100
- б) 60-80
- в) 40-50
- г) 30-40

93.С целью исключения какого заболевания делается мазок на «ВЛ»:

- а) сифилиса носа
- б) ангины Симановского
- в) дифтерии
- г) лакунарной ангины

94.Положение больного при носовом кровотечении:

- а) лежа на спине
- б) сидя с запрокинутой назад головой
- в) сидя с наклоненной вперед головой
- г) лежа на боку

95. При отосклерозе основными жалобами больного являются:

- а) снижение слуха
- б) шум в ухе
- в) головокружение
- г) улучшение слуха в шумной обстановке (паракузис Визилии)
- д) боль в ухе

96. Компресс на сосцевидный отросток ставится со спиртом в концентрации:

- а) 96
- б) 70
- в) 45
- г) 10

97. Характерные симптомы для перфорированной стадии острого среднего отита:

- а) гноетечение из уха
- б) понижение слуха
- в) повышенная температура
- г) усиление боли в ухе
- д) головокружение

98. В первом периоде острого среднего отита звук латерализуется (при обследовании камертоном):

- а) в сторону здорового уха
- б) в сторону больного уха
- в) остается посередине

99. Тонзиллотом необходим для:

- а) частичного удаления небных миндалин
- б) удаления носоглоточной миндалины
- в) удаления язычной миндалины
- г) прокола гайморовой пазухи

100. Форма хронического гнойного среднего отита, при которой наиболее часто наблюдаются опасные для жизни осложнения:

- а) мезотимпанит
- б) эптитимпанит
- в) аллергическая
- г) адгезивная

101. В каких случаях при остром среднем отите показан парацентез:

- а) выпячивание барабанной перепонки
- б) сильные боли
- в) высокая температура
- г) втянутость барабанной перепонки
- д) нарушение равновесия

102. Первая помощь при травме барабанной перепонки:

- а) закапать раствор 3% перекиси водорода
- б) ввести в слуховой проход стерильный ватный тампон
- в) промыть ухо
- г) закапать раствор борной кислоты

103. Первая помощь при ложном крупе:

- а) сделать щелочную ингаляцию
- б) обеспечить приток свежего воздуха
- в) сделать горячую ножную ванну
- г) применить холодный компресс на шею
- д) поставить горчичник на затылок

104. Размеры тампона для задней тампонады носа определяются по:

- а) размеру кулака больного
- б) совмещенным ногтевым фалангам больших пальцев рук больного
- в) совмещенным фалангам указательного и среднего пальцев рук больного
- г) длине спинки носа

105. Лакунарная и фолликулярная ангины относятся к заболеваниям:

- а) инфекционным
- б) оториноларингологическим
- в) терапевтическим
- г) хирургическим

106. Для дифтерии характерно:

- а) слабая выраженность болевых ощущений
- б) бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой носа
- в) ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин
- г) наличие плотных, трудно снимающихся серых налетов
- д) гной в лагунах миндалин

107. После удаления небных миндалин пациент состоит на диспансерном учете:

- а) 1 год
- б) 10 месяцев
- в) 6 месяцев
- г) 1 месяц

108. Полуспиртовой компресс на ухо ставят на (время в часах):

- а) 2-4
- б) 4-6
- в) 6-8
- г) 8-12