

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

Каким нормативным документом регламентирован порядок оказания психиатрической помощи?

- А «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 2 июля 1992 года N 3185-1 с изменениями и дополнениями».
- Б Приказ МЗ РФ № 1125 от 12 мая 2010г.

Каким документом регламентированы стандарты оказания наркологической помощи?

- А Приказ МЗ РФ № 704 от 12.09.88г.
- Б Приказы Минздрава России № № 129,131,132,133,134,135 от 04.09.2012 г.

Каким нормативным документом регламентирован порядок оказания наркологической помощи?

- А Приказ Минздравсоцразвития России от 9 апреля 2010 г. N 225ан
- Б Приказ Министерства здравоохранения РФ № 929 –Н от 15.11.2012г.

На основании какого нормативного документа осуществляется недобровольная госпитализация больных?

- А Закон о наркотических средствах и психотропных веществах

Б Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании

Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от алкоголя

А 3 года

Б 2 года

Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков

А 3 года

Б 5 лет

Срок профилактического наблюдения лиц с употреблением наркотических средств, с вредными последствиями

А 6 месяцев

Б 1 год

Срок профилактического наблюдения лиц с употреблением алкоголя с вредными последствиями

А 6 месяцев

Б 1 год

Порядок снятия с диспансерного наблюдения

А решения врачебной комиссии

Б на основании письменного заявления родственников больного

Для употребления алкоголя с вредными последствиями характерно

- А эпизодическое употребление
- Б наличие абстинентного синдрома

Синдром зависимости, связанный с употреблением коаксила относится к

- А наркомании
- Б токсикомании

Показания для стационарного лечения

- А абстинентный синдром легкой степени тяжести
- Б алкогольное опьянение средней степени тяжести

К электролитным растворам относятся

- А гемодез
- Б трисоль

К гепатопротекторам относятся

- А холензим
- Б гептрал

Нейролептики, подавляющие патологическое влечение к алкоголю

- А галоперидол
- Б amitриптилин

Антидепрессанты, применяемые при лечении наркологических заболеваний

- А сонапакс
- Б паксил

При лечении алкогольного опьянения средней степени тяжести применяются

- А электролитные растворы
- Б нейролептики

При передозировке наркотическими веществами опиоидной группы применяют

- А налоксон
- Б галоперидол

Для подтверждения ремиссии у больных с наркотической зависимостью применяют

- А определение электролитов в сыворотке крови
- Б иммуноферментный анализ на наличие антител к наркотикам

Для подтверждения ремиссии у больных с алкогольной зависимостью применяют

- А уровень прямого билирубина в крови
- Б анализ на карбогидрат-дефицитный трансферин методом капиллярного электрофореза (CDT)

Каковы противопоказания для участия пациентов в реабилитационных программах

- А окончание курса активной дезинтоксикационной терапии
- Б тяжелое психотическое расстройство

Для средней степени табачной зависимости характерно

- А курение 10-12 сигарет в день

Б курение 1-2 сигарет в день

**Для диагностики табачной зависимости
применяются следующие методы обследования**

А определение СО в крови

Б определение СО в выдыхаемом воздухе

Формы табачной зависимости

А идеаторная

Б неврологическая

**Никотиновая заместительная терапия проводится с
применением**

А жевательная резинка и пластырь «Никоретте»

Б картриджи с никотином

Первичная профилактика включает в себя

А психокоррекция личностных расстройств

Б работа в организованных коллективах

Вторичная профилактика включает в себя

А групповые психотерапевтические занятия с созависимыми

Б работа с пациентами и их родственниками

**Патологическое влечение к азартным играм
относится к**

А расстройство привычек и влечений

Б расстройство психологического развития

К эмоциональным расстройствам и расстройствам поведения, начинающимся в детском и подростковом возрасте относятся

- А нарушение памяти
- Б нарушение активности и внимания

Синдром относящийся к первой стадии алкоголизма

- А патологическое влечение к алкоголю
- Б алкогольный абстинентный синдром

Синдром относящийся к iii стадии алкоголизма

- А патологическое влечение к алкоголю
- Б алкогольная деградация

Высокий темп прогрессивности алкоголизма чаще наблюдается у больных

- А имеющих нарушения углеводного обмена
- Б с наследственной отягощенностью алкоголизмом родителей

Среди различных психотропных эффектов этанола в острой стадии интоксикации для личности наибольшее значение имеет

- А анксиолитический эффект
- Б эйфоризирующий эффект

Для псевдогаллюцинаций характерно

- А наличие критики к состоянию
- Б наличие ощущения сделанности

Фиксационная амнезия характеризуется

- А патологическое развитие личности
- Б выпадением из памяти событий, только что имевших место

Соматические особенности опиоидного абстинентного синдрома

- А тахикардия и гипертензия
- Б боли в мышцах и суставах

Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является

- А низкая курябельность
- Б аффективная окрашенность клинической симптоматики

Реланиум относится к

- А к психотропным препаратам
- Б к наркотикам

К стимулирующим веществам, употребление которых обуславливает развитие зависимости от наркотических средств, относятся

- А фентанил
- Б первитин

К опиоидной интоксикации относится

- А гиперимия склер
- Б сужение зрачка

К интоксикации каннабиоидами относится

- А бледность кожных покровов
- Б мидриаз

В спектре действия финлепсина (карбамазепина) различают эффекты

- А антисудорожный
- Б тонизирующий

Оглушение проявляется

- А понижением ясности сознания
- Б выраженными галлюцинаторно- бредовые включения

К кокаиновой интоксикации относится

- А эйфория, благодушие
- Б ощущение повышенных возможностей, расторможенность, гиперактивность

Неврологические нарушения в эфедроновом опьянении

- А миоз
- Б мидриаз

Для наркотического опьянения не характерно

- А изменение сознания
- Б облегченное бредопостроение

Для алкогольного абстинентного синдрома (аас) с преобладанием в клинической картине вегетативно-астенических расстройств характерно

- А потливость

Б эмоциональная взрывчатость

Для судорожных припадков в структуре аас, в отличие от эпилепсии, характерно

- А развитие психомоторного возбуждения после припадка
- Б отсутствие на ЭЭГ характерных для эпилепсии изменений

Для острой алкогольной интоксикации тяжелой степени характерно

- А угнетение сознания
- Б артериальная гипертензия

Для наркотической интоксикации характерно

- А расстройство восприятия
- Б сухость кожных покровов

Астенический синдром характеризуется

- А физическая и психическая истощаемость
- Б психический инфантилизм

К острой интоксикации галлюциногенами относится

- А эйфория, смешливость
- Б тревога и боязливость

К острой интоксикации летучими растворителями относится

- А расторможенность, гиперактивность
- Б апатия, сонливость

К острой интоксикации галлюциногенами относится

- А эйфория, смещливость
- Б тревога и боязливость

Для алкогольного делирия наиболее характерны

- А слуховые галлюцинации
- Б истинные зрительные галлюцинации

Для профессионального делирия характерно

- А разные по содержанию, координированные действия
- Б однообразные, автоматизированные движения

Для алкогольного галлюциноза наиболее характерны

- А слуховые галлюцинации
- Б истинные зрительные галлюцинации

Расстройства восприятия при канобиноидной интоксикации преобладают в

- А зрительном анализаторе
- Б слуховом анализаторе

При алкогольном параноиде бред носит

- А ограниченный, конкретный характер
- Б полиморфный; диффузный характер, с нелепостью, замысловатостью

Укажите преобладающий психотропный эффект препарата «триптизол» (аминотриптилин)

- А подавление бреда
- Б антидепрессивный с седативным преобладанием

Для корсаковского психоза наиболее характерны

- А конфабуляции
- Б бред ревности

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся

- А наличие пароксизмальной активности
- Б формирование бредовых построений

Наиболее распространенный метод неотложной помощи при эпилептическом припадке включает

- А внутривенно медленное введение 0.5% раствора 20-60 мг седуксена (реланиума) на изотоническом растворе хлорида натрия
- Б введение гипотензивных препаратов

Для психоорганического синдрома характерно

- А снижение памяти
- Б расстройства восприятия

Мусситирующий делирий характеризуется

- А помрачение сознания с психомоторным возбуждением, с хаотическими движениями в пределах постели

Б аффективных расстройства эндогенного характера

Алкогольный делирий характеризуется

А помрачением сознания

Б бредом величия

Корсаковский психоз характеризуется

А потеря способности запоминать текущие события
(фиксационная амнезия)

Б бредом восприятия

Для алкогольной деградации наиболее специфичным является

А психопатоподобные симптомы

Б морально-этическое снижение

К критериям синдрома зависимости относятся

А сильное желание или чувство насильственной тяги к приему
вещества

Б снижение дозы употребляемого пав

В динамике алкоголизма формирование абстинентного синдрома происходит на этапе

А в i стадии заболевания

Б в i-ii стадии заболевания

Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома (аас) характерно

А выраженное влечение к алкоголю

Б микрокататоническая симптоматика

Укажите заболевание, при котором применение ноотропов наиболее целесообразно

- А Шизофрения
- Б Корсаковский психоз

Для алкогольной деградации (психопатоподобный вариант) характерно

- А возбудимость с агрессивными поступками
- Б тоскливо-апатический фон настроения

К преходящим неврологическим расстройствам в рамках аас относятся

- А вегетативная дисфункция
- Б нарушения мозжечковых функций

Для ii стадии алкоголизма характерны

- А абстинентный синдром
- Б изменение формы опьянения

Делирий может наблюдаться при

- А острой стадии эпидемического энцефалита
- Б шизофрении

Для патологического опьянения характерно

- А сумеречное расстройство сознания
- Б нарушение дыхания по центральному типу

Алкогольный делирий возникает чаще всего

- А в первые дни после окончания многодневного злоупотребления алкоголем

Б в результате недостаточной интенсивности
дезинтоксикационной терапии

**Ведущими звеньями патогенеза при наркоманиях
являются**

А нарушение функции катехоламиновой системы
Б ферментативные нарушения

**Наиболее характерными признаками опийной
эйфории являются**

А ощущение легкости, радости, тепла, расходящегося волнами по
телу ,соматического блаженства
Б анергия

Для ii стадии опийной наркомании характерно

А физическая зависимость
Б кожные высыпания

Для I стадии опийной наркомании характерно

А исчезновение зуда кожи лица, кончика носа, верхней половины
тела
Б снижение толерантности

При опьянении барбитуратами характерно

А психомоторное возбуждение
Б нарушение координации движений

К галлюциногенам относятся

А производные лизергиновой кислоты (lsd-25)
Б первитин

К нейролептикам относятся

- А трифтазин
- Б карбамазепин

Укажите преобладающий психотропный эффект препарата галоперидол

- А купирование возбуждения, седация
- Б подавление бреда и галлюцинаций

У больных эфедроновой наркоманией отмечаются изменения кожи

- А гиперемия
- Б вульгарная гнойничковая сыпь на лице и спине

Для нарушений сна при алкоголизме характерно

- А кошмарные сновидения, поверхностный сон
- Б бессонница с астенией и аффективной неустойчивостью

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно

- А амнезия опьянения
- Б утрата защитного рвотного рефлекса

Показания для недобровольной госпитализации

- А тяжелое психотическое состояние
- Б абстинентный синдром тяжелой степени

Недобровольное освидетельствование проводится

- А на основании заявления родственников
- Б на основании решения суда

Для алкоголизма подростков, развившегося на резидуально-органической почве, характерно

- А высоко-прогредиентный тип течения заболевания
- Б усиление психоорганических расстройств

Больным наркоманией в преморбиде присущи особенности

- А акцентуации характера
- Б преждевременное половое созревание

Наиболее достоверными признаками острой опийной интоксикации являются

- А миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет
- Б расстройства восприятия

Для передозировки опиоидных наркотиков характерно

- А вялость
- Б угнетение дыхания

К середине вторых суток абстинентного состояния при опийной наркомании наиболее яркими являются расстройства

- А усиление чувства напряженности и влечения к наркотику (до непреодолимого)
- Б нарушение координации движений

Для сомато-вегетативных расстройств в состоянии острой интоксикации барбитуратами характерно

- А брадикардия, редкое глубокое дыхание
- Б резкое падение АД, частое поверхностное дыхание, тахикардия

При острой интоксикации галлюциногенами характерно

- А нарушение зрительного восприятия
- Б бред воздействия

Симптомы острой интоксикации средствами бытовой химии (ЛНДВ)

- А расширенные зрачки, инъектированные склеры, гиперемизированное лицо
- Б вкусовые галлюцинации

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой химии (ЛНДВ) являются

- А стойкий гипергидроз
- Б токсическая энцефалопатия

Каким нормативным документом регламентирован порядок оказания психиатрической помощи

- А закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 2 июля 1992 года n 3185-1 с изменениями и дополнениями.
- Б приказ мз рф № 1125 от 12 мая 2010г.

В закон о наркотических средствах и психотропных веществах от 8 января 1998 года № 3-ФЗ.

Каким документом регламентированы стандарты оказания наркологической помощи

А Приказ МЗ РФ № 704 от 12.09.88г.

Б Приказы Минздрава России № № 129,131,132,133,134,135 от 04.09.2012г.

В Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2012г. №234-ПП

Каким нормативным документом регламентирован порядок оказания наркологической помощи

А приказ минздравсоцразвития россии от 9 апреля 2010 г. п 225ан

Б приказ мвд и мз рф № 165 от 3.08.1983г.

В приказ министерства здравоохранения рф № 929 –н от 15.11.2012г

На основании какого нормативного документа осуществляется недобровольная госпитализация больных

А закон о наркотических средствах и психотропных веществах

Б решение антинаркотической комиссии при правительстве москвы

В закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании

Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от алкоголя

- А 3 года
- Б 2 года
- В 5 лет

Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков

- А 3 года
- Б 2 года
- В 5 лет

Срок профилактического наблюдения лиц с употреблением наркотических средств, с вредными последствиями

- А 6 месяцев
- Б 1 год
- В 5 лет

Срок профилактического наблюдения лиц с употреблением алкоголя с вредными последствиями

- А 6 месяцев
- Б 1 год
- В 5 лет

Порядок снятия с диспансерного наблюдения

- А на основании личного заявления
- Б решения врачебной комиссии
- В на основании письменного заявления родственников больного

Синдром зависимости, связанный с употреблением коаксила относится к

- А наркомании
- Б токсикомании
- В алкоголизму

Показания для стационарного лечения

- А абстинентный синдром легкой степени тяжести
- Б алкогольное опьянение средней степени тяжести
- В алкогольная интоксикация легкой тяжести

К электролитным растворам относятся

- А гемодез
- Б трисоль
- В реополиглюкин

К гепатопротекторам относятся

- А холензим
- Б аминалон
- В гептрал

Нейролептики, подавляющие патологическое влечение к алкоголю

- А галоперидол
- Б пантогам
- В amitriptilin

Антидепрессанты, применяемые при лечении наркологических заболеваний

- А сонапакс

- Б паксил
- В тизерцин

При лечении алкогольного опьянения средней степени тяжести применяются

- А электролитные растворы
- Б транквилизаторы
- В нейролептики

При передозировке наркотическими веществами опиоидной группы применяют

- А налоксон
- Б галоперидол
- В эглонил

Для подтверждения ремиссии у больных с наркотической зависимостью применяют

- А определение электролитов в сыворотке крови
- Б иммуноферментный анализ на наличие антител к наркотикам
- В общий клинический анализ крови

Для подтверждения ремиссии у больных с алкогольной зависимостью применяют

- А уровень прямого билирубина в крови
- Б анализ на карбогидрат-дефицитарный трансферин методом капиллярного электрофореза (cdt)
- В общий клинический анализ крови

Каковы противопоказания для участия пациентов в реабилитационных программах

- А подтверждение ремиссии
- Б окончание курса активной дезинтоксикационной терапии
- В тяжелое психотическое расстройство

Для средней степени табачной зависимости характерно

- А курение 10-12 сигарет в день
- Б курение 1-2 сигарет в день
- В курение более 40 сигарет в день

Для диагностики табачной зависимости применяются следующие методы обследования

- А определение со в крови
- Б определение со в выдыхаемом воздухе
- В определение со в моче

Формы табачной зависимости

- А идеаторная
- Б соматическая
- В неврологическая

Никотиновая заместительная терапия проводится с применением

- А жевательная резинка и пластырь «никоретте»
- Б картриджи с никотином
- В электронная сигарета

Первичная профилактика включает в себя

- А психокоррекция личностных расстройств
- Б работа в организованных коллективах

- Вторичная профилактика включает в себя**
- В реабилитационная работа
 - А групповые психотерапевтические занятия созависимыми
 - Б работа с пациентами и их родственниками
 - В реабилитационные мероприятия
- Патологическое влечение к азартным играм относится к**
- А расстройство привычек и влечений
 - Б расстройство психологического развития
 - В органические психические расстройства
- Истерический припадок проявляется**
- А тонической и клонической фазами
 - Б сложными и выразительными движениями во время припадка
 - В помрачением сознания
- К эмоциональным расстройствам и расстройствам поведения, начинающимся в детском и подростковом возрасте относятся**
- А нарушение памяти
 - Б нарушение активности и внимания
 - В слабоумие
- Навязчивые влечения характеризуются**
- А появлением вопреки разуму, воле и чувству
 - Б выполнением какого-либо бессмысленного действия
 - В отсутствием понимания чуждости

Для ипохондрического синдрома характерно

- А чрезмерно утрированное внимания к окружающим
- Б фрагментарность амнестических расстройств
- В подавленное настроение с мыслями о неизлечимой болезни

Импульсивным влечениям относятся

- А дипсомания
- Б дромомания
- В клептомания

Для псевдогаллюцинаций характерно

- А наличие критики к состоянию
- Б наличие признаков нарушения сознания
- В наличие ощущения сделанности

Фиксационная амнезия характеризуется

- А патологическое развитие личности
- Б отсутствием памяти на прошлые события
- В выпадением из памяти событий, только что имевших место

Соматические особенности опийного абстинентного синдрома

- А тахикардия и гипертензия
- Б бред отношений
- В боли в мышцах и суставах

Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно

- А прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций

- Б взрывчатый характер эмоций
- В недержание эмоций

Реланиум относится к

- А к психотропным препаратам
- Б к наркотикам
- В к снотворным

К стимулирующим веществам, употребление которых обуславливает развитие зависимости от наркотических средств, относятся

- А фентанил
- Б первитин
- В реладорм

Идеаторные автоматизмы проявляются

- А наплывы воспоминаний
- Б сделанные неприятные ощущения
- В отнятие мыслей, сделанность мыслей, разматывания воспоминаний

Изменения личности при эпилепсии характеризуются признаками

- А гиперактивность
- Б инфантилизм
- В педантизм, скрупулезность

В спектре действия финлепсина (карбамазепина) различают эффекты

- А антисудорожный
- Б тонизирующий

В улучшающий память

Оглушение проявляется

А понижением ясности сознания

Б выраженными галлюцинаторно- бредовые включения

В аффективно-вегетативными проявлениями

Парафренный синдром проявляется

А мегаломанией

Б правдивостью высказываний

В наличием бреда ревности

**К особенностям психопатических личностей
относится**

А наличие неконтролируемых аффективных колебаний

Б отгороженность от окружающих

В эндогенные, внешне не мотивированные поступки

Для наркотического опьянения не характерно

А изменение сознания

Б изменения речи

В облегченное бредопостроение

**Для алкогольного абстинентного синдрома (аас) с
преобладанием в клинической картине вегетативно-
астенических расстройств характерно**

А потливость

Б эмоциональная взрывчатость

В полинейропатия

Для судорожных припадков в структуре аас, в отличие от эпилепсии, характерно

- А стереотипность припадков
- Б развитие психомоторного возбуждения после припадка
- В отсутствие на ээг характерных для эпилепсии изменений

Для острой алкогольной интоксикации тяжелой степени характерно

- А угнетение сознания
- Б артериальная гипертензия
- В потливость

Для наркотической интоксикации характерно

- А расстройство восприятия
- Б сухость кожных покровов
- В снижение толерантности

Астенический синдром характеризуется

- А физическая и психическая истощаемость
- Б психический инфантилизм
- В фиксационная амнезия

Для депрессивной триады характерно

- А эмоциональное, двигательное, идеаторное торможение
- Б паранойяльный бред
- В депрессивное содержание мышления

Диагностическое значение имеют следующие признаки депрессии

- А наличие суточных колебаний настроения
- Б эмоциональное обеднение

- Сенестопатии характеризуются**
- В спутанность сознания
 - А разнообразные, крайне мучительные, тягостные ощущения в теле
 - Б резкими колебаниями эмоционального фона
 - В искажение формы и величины своего тела
- Бредовые идеи характеризуются**
- А доступность исправления, устранение путем убеждения
 - Б искажение отражения действительности
 - В психическими автоматизмами
- Истинным галлюцинациям свойственно**
- А нечеткость восприятия окружающего
 - Б проецирование их вовне
 - В проецирование их во внутрь
- К синдрому измененной реактивности относится**
- А полная отрешенность больных от окружающей действительности
 - Б двойная ориентировка своего «я»
 - В изменение толерантности
- Паралогическое мышление характеризуется**
- А соединение несопоставимых обстоятельств, явлений, положений
 - Б длительное преобладание одной какой-либо мысли, представления
 - В конкретность мышления

Расстройства восприятия при канобиноидной интоксикации преобладают в

- А зрительном анализаторе
- Б слуховом анализаторе
- В вкусовом анализаторе

К основным формам течения шизофрении не относится

- А приступообразно-прогредиентная
- Б непрерывно-прогредиентная
- В маниакально-депрессивная

Продром пароксизмов при эпилепсии характеризуется наличием

- А наличие ауры
- Б позывы на мочеиспускание
- В ощущением утраты реальности мира

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся

- А наличие пароксизмальной активности
- Б формирование бредовых построений
- В наличием псевдогаллюцинаций

Наиболее распространенный метод неотложной помощи при эпилептическом припадке включает

- А внутривенно медленное введение 0.5% раствора 20-60 мг седуксена (реланиума) на изотоническом растворе хлорида натрия

- Б введение гипотензивных препаратов
- В введение реополиглюкина

Для психоорганического синдрома характерно

- А снижение памяти
- Б расстройства восприятия
- В наличие сенестопатий

Мусситирующий делирий характеризуется

- А помрачение сознания с психомоторным возбуждением, с хаотическими движениями в пределах постели
- Б аффективных расстройства эндогенного характера
- В эпизоды кататонического возбуждения

Алкольный делирий характеризуется

- А помрачением сознания
- Б сонливостью
- В бредом величия

Корсаковский психоз характеризуется

- А потеря способности запоминать текущие события (фиксационная амнезия)
- Б бредом восприятия
- В паралогичность

Для алкогольной деградации наиболее специфичным является

- А аффективные расстройства
- Б психопатоподобные симптомы
- В морально-этическое снижение

К критериям синдрома зависимости относятся

- А сильное желание или чувство насильственной тяги к приему вещества
- Б снижение дозы употребляемого пав
- В тяжелая неврологическая патология

В динамике алкоголизма формирование абстинентного синдрома происходит на этапе

- А в i стадии заболевания
- Б в i-ii стадии заболевания
- В в iii стадии заболевания

Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома (аас) характерно

- А выраженное влечение к алкоголю
- Б микроклатоническая симптоматика
- В менингеальные симптомы

Укажите заболевание, при котором применение ноотропов наиболее целесообразно

- А шизофрения
- Б невроз навязчивых состояний
- В корсаковский психоз

Для алкогольной деградации (психопатоподобный вариант) характерно

- А возбудимость с агрессивными поступками
- Б тоскливо-апатический фон настроения
- В выраженные расстройства памяти на текущие события

К преходящим неврологическим расстройствам в рамках аас относятся

- А вегетативная дисфункция
- Б нарушения мозжечковых функций
- В алкогольная полинейропатия

Для ii стадии алкоголизма характерны

- А абстинентный синдром
- Б изменение формы опьянения
- В резкое снижение толерантности

Делирий может наблюдаться при

- А острой стадии эпидемического энцефалита
- Б шизофрении
- В эпилепсии

Для патологического опьянения характерно

- А сумеречное расстройство сознания
- Б высокий риск суицидального поведения
- В нарушение дыхания по центральному типу

Алкогольный делирий возникает чаще всего

- А в первые дни после окончания многодневного злоупотребления алкоголем
- Б в результате недостаточной интенсивности дезинтоксикационной терапии
- В на высоте алкогольной интоксикации

Ведущими звеньями патогенеза при наркоманиях являются

- А нарушение функции катехоламиновой системы

- Б ферментативные нарушения
- В нарушение обмена витаминов группы в

Наиболее характерными признаками опийной эйфории являются

- А ощущение легкости, радости, тепла, расходящегося волнами по телу, соматического блаженства
- Б анергия
- В психомоторное возбуждение

Для II стадии опийной наркомании характерно

- А физическая зависимость
- Б кожные высыпания
- В брадикардия

Для I стадии опийной наркомании характерно

- А исчезновение зуда кожи лица, кончика носа, верхней половины тела
- Б снижение толерантности
- В сформированный абстинентный синдром

При опьянении барбитуратами характерно

- А психомоторное возбуждение
- Б галлюцинации
- В нарушение координации движений

К галлюциногенам относятся

- А производные лизергиновой кислоты (lsd-25)
- Б первитин
- В метадон

К нейролептикам относятся

- А трифтазин
- Б карбамазепин
- В прозак

Укажите преобладающий психотропный эффект препарата галоперидол

- А купирование возбуждения, седация
- Б подавление бреда и галлюцинаций
- В купирование депрессии, активизация

У больных эфедроновой наркоманией отмечаются изменения кожи

- А гиперемия
- Б вульгарная гнойничковая сыпь на лице и спине
- В повышенный тургор

Для нарушений сна при алкоголизме характерно

- А кошмарные сновидения, поверхностный сон
- Б бессонница с астенией и аффективной неустойчивостью
- В сохранение чувства сна при отсутствии чувства отдыха после сна

Для начальной стадии алкоголизма (I стадии) характерно

- А амнезия опьянения
- Б утрата защитного рвотного рефлекса
- В затрудненное засыпание

Показания для недобровольной госпитализации

- А тяжелое психотическое состояние
- Б абстинентный синдром тяжелой степени
- В длительный запой

Недобровольное освидетельствование проводится

- А на основании заявления родственников
- Б на основании решения суда
- В по заявлению адвоката

Для алкоголизма подростков, развившегося на резидуально-органической почве, характерно

- А высоко-прогредиентный тип течения заболевания
- Б усиление психоорганических расстройств
- В умеренно-прогредиентный тип течения заболевания

Больным наркоманией в преморбиде присущи особенности

- А акцентуации характера
- Б преждевременное половое созревание
- В паранойяльность

Наиболее достоверными признаками острой опийной интоксикации являются

- А миоз с отсутствием или крайне вялой реакцией зрачков на свет
- Б расстройства восприятия
- В сохранение рвотного рефлекса

Для передозировки опиоидных наркотиков характерно

- А вялость
- Б подавленное настроение
- В угнетение дыхания

К середине вторых суток абстинентного состояния при опиной наркомании наиболее яркими являются расстройства

- А усиление чувства напряженности и влечения к наркотику (до непреодолимого)
- Б нарушение координации движений
- В усиливающаяся сухость слизистых

Для сомато-вегетативных расстройств в состоянии острой интоксикации барбитуратами характерно

- А гиперсаливация
- Б горячий пот
- В миоз

При острой интоксикации галлюциногенами характерно

- А нарушение зрительного восприятия
- Б бред воздействия
- В стойкий вербальный галлюциноз

Симптомы острой интоксикации средствами бытовой химии (лндв)

- А расширенные зрачки, инъектированные склеры, гиперемированное лицо

- Б вкусовые галлюцинации
- В острые расстройства мышления

Последствиями ингаляционного употребления средств бытовой химии (лндв) являются

- А стойкий гипергидроз
- Б токсическая энцефалопатия
- В стойкая мышечная гипертензия

Какими документами регламентирован порядок оказания психиатрической помощи

- А закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
- Б приказ минздрава россии от 12 мая 2010г. № 1125
- В закон о наркотических средствах и психотропных веществах
- Г приказ минздравсоцразвития россии от 17 мая 2012 г. №566н

Какими документами регламентированы стандарты оказания наркологической помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ в амбулаторных условиях

- А приказ департамента здравоохранения города москвы от 12.03.2003 № 114
- Б приказ минздрава россии от 04.09.2012г. № 124н
- В приказ департамента здравоохранения города москвы от 20.05.2014 № 477
- Г приказ минздрава россии от 04.09.2012г. № 135н

Какими документами регламентированы стандарты оказания наркологической помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ в стационарных условиях

- А приказ департамента здравоохранения города москвы от 12.03.2003 № 114
- Б приказ минздрава россии от 04.09.2012г. № 124н
- В приказ департамента здравоохранения города москвы от 20.05.2014 № 477
- Г приказ минздрава россии от 04.09.2012г. № 135н

Каким нормативным документом регламентирован порядок оказания наркологической помощи

- А приказ минздрава россии от 15ноября 2012 г. № 929н
- Б закон о наркотических средствах и психотропных веществах
- В приказ минздравсоцразвития россии от 17 мая 2012 г. №566н
- Г приказ минздравсоцразвития россии от 10.04.2010г.№ 225н

На основании какого нормативно-правового акта осуществляется недобровольная госпитализация больных

- А закон о наркотических средствах и психотропных веществах
- Б решение суда

- В закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
- Г на основании письменного заявления родственников больного и распоряжения руководителя лечебного учреждения

Какой срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от алкоголя

- А 3 года
- Б 2 года
- В 5 лет
- Г 10 лет

Какой срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков

- А 3 года
- Б 2 года
- В 5 лет
- Г 10 лет

К методам когнитивной психотерапии относятся

- А рационально-эмотивная психотерапия
- Б клиент-центрированная психотерапия
- В когнитивная психотерапия бека
- Г поведенческая психотерапия

Групповая психотерапия при лечении больных с синдромом зависимости от алкоголя обеспечивает

- А осознание общности проблем у больных
- Б влияние больных друг на друга в группе
- В отторжение группой больных с обострением влечения
- Г пассивность в группе в процессе психотерапевтической работы

Для диагноза: "употребление алкоголя с вредными последствиями" характерно

- А употребление алкоголя 1 раз в год
- Б наличие абстинентного синдрома
- В наличие осложнений соматического характера
- Г эпизодическое употребление

Созависимость в семьях больных алкоголизмом проявляется в

- А совместном распитии спиртного
- Б характерных личностных изменениях
- В отказа от собственных интересов, проблем, увлечений
- Г извлечении вторичных выгод из болезни

Синдром зависимости, связанный с употреблением коаксила относится к

- А наркомании
- Б токсикомании
- В алкоголизму
- Г полинаркомании

К электролитным растворам относятся

- А раствор рингера
- Б трисоль
- В раствор полиаминов
- Г реополиглюкин

К гепатопротекторам относятся

- А эссенциале
- Б аллохол
- В гептрал
- Г аминалон

Нейролептики, подавляющие патологическое влечение к алкоголю

- А галоперидол
- Б паксил
- В эглонил
- Г amitриптилин

Антидепрессанты, применяемые при лечении нарколологических заболеваний

- А мелипрамин
- Б паксил
- В тизерцин
- Г нифекард

Гипносуггестивная психотерапия в лечении больных с синдромом зависимости от алкоголя применяется с целью

- А лечения астенического синдрома алкогольного генеза
- Б способа преодоления анозогнозии
- В выработки аверсии к алкоголю

Г формирования мотива к дозированному потреблению алкоголя

Антидотом при передозировке наркотическими веществами опиоидной группы является

- А налоксон
- Б бемегрид
- В кордиамин
- Г феназепам

Для подтверждения ремиссии у больных с наркологической зависимостью применяют

- А тест-полоски
- Б иммуноферментный анализ на наличие антител к наркотикам
- В биохимический анализ крови
- Г определение содержания холестерина в крови

Для подтверждения ремиссии у больных с алкогольной зависимостью применяют

- А исследование аст, алт, гgt
- Б анализ на карбогидрат-дефицитарный трансферин методом капиллярного электрофореза(cdt)
- В общий клинический анализ крови
- Г определение содержания холестерина в крови

Каковы противопоказания для участия пациентов в реабилитационных программах

- А отсутствие установок на прохождении программы
- Б окончание курса активной дезинтоксикационной терапии

- В психотическое состояние
- Г состояние ремиссии

Активное слушание пациента подразумевает

- А вербальное кондиционирование
- Б запись полученной информации
- В расположение друг напротив друга
- Г использование пауз и молчания

**Для диагностики табачной зависимости
применяются следующие методы обследования**

- А определение со в крови
- Б определение со в выдыхаемом воздухе
- В определение со в моче
- Г определение уровня холестерина в крови

Формы табачной зависимости

- А идеаторная
- Б диссоциированная
- В психосоматическая
- Г неврологическая

**Никотиновая заместительная терапия проводится с
применением**

- А жевательная резинка и пластырь «никоретте»
- Б картриджи с никотином
- В табекс
- Г чампекс

Первичная профилактика включает в себя

- А работа с семьей
- Б работа в организованных коллективах
- В реабилитационная работа
- Г психокоррекция личностных расстройств

Вторичная профилактика включает в себя

- А работа с группами риска
- Б работа с пациентами и их родственниками
- В реабилитационные мероприятия
- Г групповые психотерапевтические занятия созависимыми

Паталогическое влечение к азартным играм относится к

- А расстройство привычек и влечений
- Б расстройство психологического развития
- В органические психические расстройства
- Г психические расстройства, связанные с употреблением пав

К эмоциональным расстройствам и расстройствам поведения, начинающимся в детском и подростковом возрасте относятся

- А делинквентность
- Б нарушение активности и внимания
- В астения
- Г олигофрения

Истерический припадок проявляется

- А тонической и клонической фазами
- Б сложными и выразительными движениями во время припадка
- В помрачением сознания

Г усиление припадка при скоплении людей

Навязчивые влечения характеризуются

- А появлением вопреки разуму, воле и чувству
- Б выполнение какого-либо бессмысленного действия
- В отсутствие понимания чуждости
- Г болевыми ощущениями

Рациональная психотерапия показана

- А пациентам без психических расстройств
- Б пациентам с неврозом ожидания неудачи
- В пациентам с личностными расстройствами
- Г все перечисленное верно

К импульсивным влечениям относятся

- А дипсомания
- Б дромомания
- В клептомания
- Г графомания

Для псевдогаллюцинаций характерно

- А отсутствие критики
- Б безжизненность, беззвучность, бестелесность
- В проекция внутри организма
- Г все перечисленное верно

Фиксационная амнезия характеризуется

- А потерей способности запоминать
- Б отсутствием памяти на текущие события дня
- В выпадением из памяти событий, только что имевших место

Г все перечисленное верно

Соматические особенности опийного абстинентного синдрома

- А гипостезия
- Б тахикардия и гипертензия
- В слезотечение, насморк
- Г боли в мышцах и суставах

Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно

- А прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций
- Б неадекватность, парадоксальность эмоциональных реакций
- В противоречивость эмоций
- Г все перечисленное верно

Реланиум относится к

- А к психотропным препаратам
- Б к наркотикам
- В гипотензивным препаратам
- Г к снотворным

К стимулирующим веществам, употребление которых приводит к зависимости от наркотических средств относятся

- А кокаин
- Б первитин
- В реладорм
- Г фенobarбитал

Идеаторные автоматизмы проявляются

- А мнимое воздействие на процессы мышления
- Б ментизм, симптом открытости, звучание мыслей
- В сделанные неприятные ощущения
- Г наплывы сенестопатий

**Изменения личности при эпилепсии
характеризуются признаками**

- А снижение психической активности
- Б инфантилизм
- В злопамятность
- Г эгоцентризм

**В спектре действия финлепсина (карбамазепина)
различают эффекты**

- А антисудорожный
- Б успокаивающий
- В тонизирующий
- Г улучшающий память

Оглушение проявляется

- А понижением ясности сознания
- Б бредовыми включениями
- В замедлением и затруднением мышления
- Г понижением настроения

Парафренный синдром проявляется

- А мегаломанией
- Б правдивостью высказываний
- В склонностью к расширению бреда
- Г наличием бреда ревности

Основными принципами позитивной психотерапии являются

- А волевое преодоление болезненного состояния
- Б формирование оптимистического взгляда на жизнь
- В восприятие симптомов не только как патологии
- Г расширение жизненных целей с использованием поучительных историй

Общими признаками наркоманического опьянения являются

- А изменение сознания
- Б изменения речи
- В изменение двигательной активности
- Г все перечисленное

К традиционному лечебному гипнозу относится

- А применение метафор
- Б отдых в состоянии транса
- В "рассеивание текста"
- Г "постройка" к поведению пациента

Для судорожных припадков в структуре аас, в отличие от эпилепсии, характерно

- А преобладание тонической фазы в картине припадка
- Б стереотипность припадков
- В развитие психомоторного возбуждения после припадка
- Г отсутствие на ээг характерных для эпилепсии изменений

Для острой алкогольной интоксикации тяжелой степени характерно

- А угнетение сознания
- Б артериальная гипертензия
- В гипотермия
- Г пониженное настроение

Для наркотической интоксикации характерно

- А расстройство восприятия
- Б дисморфомания
- В изменение аффекта
- Г снижение толерантности

Астенический синдром характеризуется

- А физическая истощаемость
- Б психическая истощаемость
- В фиксационная амнезия
- Г гипостезия

Для депрессивной триады характерно

- А эмоциональное торможение
- Б двигательное торможение
- В идеаторное торможение
- Г все перечисленное верно

Диагностическое значение имеют следующие признаки депрессии

- А наличие или отсутствие суточных колебаний настроения
- Б наличие или отсутствие в анестетических депрессиях компонента dolorosa
- В депрессивный ступор

Сенестопатии характеризуются

- Г все перечисленное верно
- А разнообразные, крайне мучительные, тягостные ощущения в теле
- Б отсутствие констатируемых соматическими методами исследований причин
- В пониженное настроение
- Г искажение формы и величины своего тела

Бредовые идеи характеризуются

- А несоответствие действительности
- Б доступность исправления, устранение путем убеждения
- В наличием сенестопатий
- Г невозможность исправления, несмотря на явное противоречие с реальностью

Истинным галлюцинациям свойственно

- А произвольное возникновение представлений
- Б проецирование их вовне
- В яркость, неотличимость от реальных предметов
- Г все перечисленное

К синдрому измененной реактивности относится

- А полная отрешенность больных от окружающей действительности
- Б двойная ориентировка своего «я»
- В изменение толерантности
- Г изменение формы опьянения

Паралогическое мышление характеризуется

- А длительное преобладание одной какой-либо мысли, представления
- Б утрата логической связи
- В ослаблением фиксационной памяти
- Г соскальзывание с основного ряда мышления на побочный

Расстройства восприятия при наркотической интоксикации преобладают в

- А зрительном анализаторе
- Б слуховом анализаторе
- В тактильном анализаторе
- Г все перечисленное верно

Основными формами течения шизофрении являются

- А приступообразно-прогредиентная
- Б непрерывно-прогредиентная
- В рекуррентная
- Г все перечисленное верно

Продром пароксизмов при эпилепсии характеризуется наличием

- А расстройством сознания
- Б аффективных расстройств
- В сенестопатических расстройств
- Г ощущением утраты реальности мира

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся

- А типичными изменениями личности

- Б припадками
- В наличием сенестопатий
- Г наличием псевдогаллюцинаций

Наиболее распространенный метод неотложной помощи при эпилептическом припадке включает

- А внутривенное медленное введение 0.5% раствора 20-60 мг седуксена (реланиума) на 20% растворе глюкозы
- Б внутривенно медленное введение 0.5% раствора 20-60 мг седуксена (реланиума) на изотоническом растворе хлорида натрия
- В введение гипотензивных препаратов
- Г введение реополиглюкина

Для психоорганического характерно

- А снижение памяти
- Б конкретность мышления
- В слабоумие
- Г все перечисленное верно

Реланиум показан при лечении

- А аффективных расстройств невротического генеза
- Б аффективных расстройств невротического уровня
- В аффективных расстройств эндогенного характера
- Г все перечисленное верно

Алкольный делирий характеризуется

- А помрачением сознания
- Б сонливостью

- В преобладанием зрительных галлюцинаций при возможных вербальных
- Г бредом величия

Корсаковский психоз характеризуется

- А потеря способности запоминать текущие события (фиксационная амнезия)
- Б наличие конфабуляций
- В наличие псевдореминисценций
- Г все перечисленное верно

Для алкогольной деградации наиболее специфичным является

- А аффективные расстройства
- Б психопатоподобные симптомы
- В стойкое снижение памяти и интеллекта
- Г морально-этическое снижение

К критериям синдрома зависимости относятся

- А сильное желание или чувство насильственной тяги к приему вещества
- Б нарушение способности контролировать прием вещества
- В социальная дезадаптация
- Г снижение дозы употребляемого пав

В динамике алкоголизма формирование абстинентного синдрома происходит на этапе

- А систематического употребления алкоголя
- Б в I стадии заболевания
- В при переходе во II стадию
- Г во II стадии заболевания

Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома (аас) характерно

- А выраженный гипергидроз
- Б генерализованный тремор
- В выраженное влечение к алкоголю
- Г все перечисленное верно

Для аас с преобладанием психических расстройств характерно

- А депрессивно-тревожный аффект с пугливостью
- Б расстройство сна, кошмарные сновидения
- В снижение толерантности к алкоголю
- Г вербальный галлюциноз

Для алкогольной деградации (психопатоподобный вариант) характерно

- А возбудимость с агрессивными поступками
- Б постоянное влечение к алкоголю
- В выраженные расстройства памяти на текущие события
- Г дисфории или подавленность настроения

К преходящим неврологическим расстройствам в рамках аас относятся

- А тремор
- Б вегетативная дисфункция
- В нарушения мозжечковых функций
- Г алкогольная полинейропатия

Для ii стадии алкоголизма характерны

- А спонтанно возникающее влечение к алкоголю

- Б абстинентный синдром
- В снижение толерантности
- Г тотальные амнезии состояния опьянения

Делирий может наблюдаться при

- А интоксикациях
- Б инфекционных заболеваниях
- В шизофрении
- Г эпилепсии

Для патологического опьянения характерно

- А импульсивность
- Б сумеречное расстройство сознания
- В высокий риск суицидального поведения
- Г нарушение дыхания по центральному типу

Алкогольный делирий возникает чаще всего

- А в первые дни после окончания многодневного злоупотребления алкоголем
- Б на высоте аас
- В в период завершения аас
- Г верно все перечисленное

Ведущими звеньями патогенеза при наркоманиях являются

- А нарушение функции катехоламиновой системы
- Б нарушение транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток
- В нарушение метаболизма серотонина
- Г верно все перечисленное

Наиболее характерными признаками опийной эйфории являются

- А ощущение легкости, радости, соматического блаженства, благодушие, довольство
- Б приятная истома, покой и расслабленность, ощущение тепла, волнами расходящегося по телу
- В идеаторное ускорение
- Г психомоторное возбуждение

ii стадия опийной наркомании проявляется

- А физическая зависимость
- Б рост толерантности
- В изменение формы употребления наркотика -выработка индивидуального ритма приема
- Г все перечисленное верно

Методы проведения психологических тренингов по программе "активной позитивной профилактики зависимого поведения среди детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в детских дошкольных учреждениях"

- А игровая терапия
- Б арт-терапия
- В эмоционально-стрессовый метод
- Г информационный

Для опьянения барбитуратами характерно

- А латеральный нистагм
- Б дизартрия
- В нарушение координации движений

Г верно все перечисленное

К галлюциногенам относятся

- А производные лизергиновой кислоты (lsd-25)
- Б кокаин
- В метадон
- Г каннабиноиды

К нейролептикам относятся

- А трифтазин
- Б этапиразин
- В карбамазепин
- Г прозак

Для мусситирующего делирия характерно

- А возбуждение в пределах постели
- Б бессвязное бормотание
- В отсутствие реакции на внешние раздражители
- Г конфабуляции

У больных эфедроновой наркоманией отмечаются изменения кожи

- А бледность кожи с сероватым оттенком
- Б множественные пигментные пятна и ссадины в местах инъекций
- В вульгарная гнойничковая сыпь на лице и спине
- Г все перечисленное верно

Для нарушений сна при алкоголизме характерно

- А раннее пробуждения

- Б бессонница с астенией и аффективной неустойчивостью
- В затрудненное засыпание
- Г кошмарные сновидения, поверхностный сон

Основные условия, обеспечивающие эффективность профилактических воздействий по программе активной позитивной профилактики зависимого поведения среди детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в детских дошкольных учреждениях"

- А привлечение родителей
- Б учет возрастных особенностей целевой группы
- В участников в группе более 15 человек
- Г проведение занятия в спортивном или музыкальном зале

Неэффективные стратегии родительского воспитания, корректируемые в рамках программы профилактики «эффективный родитель»

- А директивный авторитарный стиль
- Б доверительно-партнерский
- В гиперопека
- Г безусловная любовь

Неврологические нарушения при корсаковском психозе представлены

- А невриты конечностей
- Б расстройства мышления
- В нарушение чувствительности
- Г менингеальные знаки

Для алкоголизма подростков, развившегося на резидуально-органической почве, характерно

- А высоко-прогредиентный тип течения заболевания
- Б криминогенное состояние опьянения
- В усиление психоорганических расстройств
- Г умеренно-прогредиентный тип течения заболевания

Больным наркоманией в преморбиде присущи особенности

- А высокая частота перинатальной и ранней постнатальной патологии
- Б затруднение в социальной адаптации
- В различные психопатологические расстройства (логоневроз, невротические реакции)
- Г все перечисленное верно

Основные принципы гармоничных детско-родительских отношений с подростками, применяемые в рамках программы профилактики «эффективный родитель»

- А критичность
- Б применение физических наказаний
- В сепарация
- Г дистанцирование

Признаки функциональной семьи, формируемые в рамках "программы помощи семьям пациентов, страдающих признаками функциональной семьи, формируемые в рамках

- А свободное выражение собственных чувств
- Б формализация отношений
- В безопасная атмосфера
- Г симбиотические взаимоотношения

Что значит системный подход в работе с созависимостью в рамках "программы опосредованной профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних для их родителей"

- А работа с одним из родителей
- Б работа с супружеской парой
- В работа с расширенной семьей (включая три поколения)
- Г работа с бабушками/дедушками, минуя родителей

Первичная профилактика аддиктивного поведения в рамках комплексной "программы первичной позитивной профилактики аддиктивного поведения в образовательных учреждениях" проводится

- А с детьми, не имеющими опыта употребления психоактивных веществ
- Б с пациентами, стоящими на учете в наркологических учреждениях
- В со всеми участниками образовательного процесса
- Г с детьми в возрасте 10 лет

Наиболее эффективными формами "первичной позитивной профилактики аддиктивного поведения в образовательных учреждениях" являются

- А тренинг позитивных жизненных навыков
- Б информативные лекции
- В интерактивные дискуссии
- Г проведение конкурса «антинаркотический рисунок»

Арт-терапия, применяемая в программе профилактики зависимого поведения с применением методов арт-терапии, является

- А методом аллопатической медицины
- Б методом психологической коррекции
- В направлением психотерапии
- Г методом народной медицины

Условия эффективности проведения терапевтического сеанса в рамках программы профилактики зависимого поведения с применением методов арт-терапии

- А психотическое состояние участника группы
- Б активная обратная связь
- В добровольность
- Г состояние нейролепсии

Укажите преобладающий психотропный эффект препарата галоперидол

- А купирование возбуждения, седация
- Б подавление бреда и галлюцинаций
- В купирование депрессии, активизация
- Г анксиолитический (противотревожный) эффект

Укажите преобладающий психотропный эффект препарата триптизол (амитриптилин)

- А купирование возбуждения, седация
- Б подавление бреда и галлюцинаций
- В купирование депрессии, активизация
- Г антидепрессивный с седативным приобладанием

Выбор лекарственных препаратов для лечения возбужденного больного, находящегося в состоянии острого чувственного бреда

- А нифекард
- Б amitриптилин
- В галоперидол
- Г реланиум

Укажите заболевание, при котором применение ноотропов наиболее целесообразно

- А шизофрения
- Б маниакально-депрессивный психоз
- В генуинная эпилепсия
- Г корсаковский психоз

В какой возрастной период формируется склонность к созависимому поведению, согласно программе опосредованной профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних для их родителей

- А от 0 до 3 лет
- Б в подростковый период
- В к моменту вступления в брак
- Г в ранней юности

Какими нормативными документами регламентируется проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения у водителей транспортных средств

- А временная инструкция о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения (утверждена заместителем министра здравоохранения ссср 1 сентября 1988 г. №06- 14/33-14)
- Б приказ № 308 от 14 июля 2003 г.
- В приказ минздрава ссср от 8 сентября 1988 г. № 694
- Г приказ комитета здравоохранения г. Москвы от 26 июня 1997 г. N 340 "об инструкции о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения в учреждениях комитета здравоохранения г. Москвы"

Какое количество исследований измерительными приборами проводится при медицинском освидетельствовании на состояние, алкогольного опьянения

- А 1
- Б 2
- В 3
- Г 4

Является ли использование тест – полосок для выявления наркотических средств основанием для вынесения заключения о состоянии опьянения

- А нет
- Б да
- В в зависимости от места проведения медицинского освидетельствования
- Г верно Б и В

Возможно ли вынесение заключения об опьянении у лица, управляющего транспортным средством при положительном результате исследования выдыхаемого воздуха и отсутствии клинических признаков опьянения

- А нет
- Б да
- В да в случае трехкратного исследования выдыхаемого воздуха
- Г верно Б и В

Осуществляется ли исследование выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя при подозрении на употребление наркотических веществ

- А да, при наличии запаха алкоголя
- Б нет
- В да
- Г да, только у водителей транспортных средств

В течении какого времени хранится акт медицинского освидетельствования, заполненного на водителя транспортного средства в медицинской организации

- А 5 лет
- Б 2 года
- В 10 лет
- Г 3 года

Какая медицинская документация оформляется при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения у лица, управляющего транспортным средством

- А акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством
- Б протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
- В листок нетрудоспособности
- Г протокол об отстранении от управления транспортным средством

Влияет ли концентрация выявленных наркотических веществ на вынесение заключения об опьянении

- А влияет при превышении пороговых величин
- Б влияет при выявлении определенных групп наркотических веществ
- В нет, не влияет
- Г влияет только при наличии клинических признаков

**Может ли отсутствие бланков протоколов и актов
медицинского освидетельствования служить
причиной отказа в освидетельствовании**

- А да
- Б нет
- В да, в случае направления сотрудниками овд и уфскн
- Г да, для сельской местности

**Является ли отбор биологических сред
обязательным при проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения**

- А является во всех случаях
- Б только при направлении после дорожно-транспортного происшествия
- В при судебно-медицинской экспертизе
- Г является при подозрении на опьянение, вызванного употреблением пав

**Срок хранения журнала регистрации медицинских
освидетельствований для установления факта
употребления алкоголя и опьянения**

- А 3 года
- Б 10 лет
- В 5 лет
- Г 1 год

**Отказ от медицинского освидетельствования
выносится при**

- А не согласии с результатами медицинского освидетельствования
- Б отказе предоставить свои паспортные данные
- В отказе освидетельствуемого от освидетельствования в целом или того или иного вида исследования в рамках проводимого освидетельствования
- Г отказе пройти освидетельствование у сотрудников гибдд дпс

Возможно ли выявление паров этанола в выдыхаемом воздухе у освидетельствуемого, страдающего сахарным диабетом

- А да
- Б да, при кетоацидозе
- В да, при течении болезни свыше трех лет
- Г нет

При оказании неотложной медицинской помощи в медицинских организациях лицам, пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях, заключение о наличии опьянения выносится по результатам химико–токсикологического исследования биологического объекта (кровь или моча) при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации

- А - 0,0 гр./л.
- Б - 0,3 гр./л.
- В - 0,5 гр./л.
- Г - 1,0 гр./л.